

बुलबुल सिरीज़—संख्या २

जन्मतु-जगत के जौहर

लेखक—

श्री नारायण प्रसाद अरोड़ा

प्रकाशक—

भीष्म एण्ड ब्रादर्स
पटकापुर, कानपुर

द्वितीय बार]

जून १९४५

[मूल्य १]

अपनी बात

दो-एक अंगरेजी पुस्तकों में जानवरों, पक्षियों, और कीढ़े-मकोड़ों की कुछ विचित्र बातें पढ़ कर मन में हृच्छा हुई, यदि इन बातों को हिन्दी में लिख दिया जाय तो कुछ और लोगों की भी ज्ञान-वृद्धि हो। अतः कुछ लिख मारा। परन्तु पशु-पक्षियों के नामों के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई। वथासाध्य मैंने अंगरेजी नामों की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है फिर भी मेरे अज्ञान के कारण सम्भव है कुछ ऐसे शब्द रह गये हैं जिनका रूपान्तर न लिखा गया हो, उनके लिये क्षमा प्रार्थना है।

इस दूसरे संस्करण में इन तमाम शब्दों को संग्रह करके एक शब्द-कोष के रूप में पुस्तक के अंत में दे दिया है। आशा है पाठक इससे लाभ उठायेंगे।

इस पुस्तक में जीव-जन्मुओं का न तो क्रमवृद्ध विकास ही लिखा गया है और न उनका विशेष विवरण ही दिया गया है। इसमें तो उनकी विचित्र और चकित कर देने वाली थोड़ी-सी बातों का संकेत मात्र है। अधिक जिज्ञासा रखने वालों के लिये जीव-जन्म सम्बन्धी साहित्य अंगरेजी में तो भरा पड़ा है और हिन्दी में भी कुछ है ही। जिज्ञासु कोग खोजें और पढ़ें। मैंने तो जानवरों के थोड़े से जौहर संग्रह कर दिये हैं। यदि इनसे किसी का मनोरंजन हुआ अथवा कुछ भी ज्ञान वृद्धि हुई और जीव-जन्म सम्बन्धी जिज्ञासा बड़ी तो मैं अपना श्रम सफल समझूँगा।

—लेखक

समर्पण

प्रिय द्रोण !

तुम्हें जानवरों का बहुत शौक था । जिस वक्त जेल में मैं यह पुस्तक लिख रहा था, उस समय सोच रहा था कि जब तुम मेरी यह कापी पढ़ोगे तो बहुत प्रसन्न होगे । किन्तु विधि का विधान कुछ और ही था । अब तुम्हारे नाम के सामने “स्वर्गीय” शब्द लिख कर यह पुस्तक तुम्हें भेट करनी पड़ रही है । लो बेटा ! आपने अभागे बाप की यह स्नेह-भेट स्वीकार करो । मेरे मन में तो :—

‘यही थी एक तमच्छा ज़िन्दगी में आखिरी अपनी ।

कि तुम साहिल पै होते और किंशती झूबती अपनी ॥

परन्तु औंधी दुनिया में हुआ इसके प्रतिकूल । और मैं तुम्हें देख भी न सका ।

—नारायण

विषय सूची

१-डिम्ब	४	२३-बिजली उत्पन्न करने	
२-भोजन	७	वाली मछलियाँ	७४
३-गति के अनेक रूप	१२	२४-यात्री-जीव	७७
४-जीव-जन्तु और समाज	१७	२५-प्राणी-राज्य में सुरंग	
५-मुदाने के बदले नये शरीर	२४	बनाने वाले जीव	६९
६-भोजन के लिये जानवर	२७	२६-जानवर सोते कैसे हैं ?	६९
७-पालक-पिता	२८	२७-पक्षी जगत में बुनकर	८५
८-दीर्घकार सर्प और कृमि	३१	२८-जानवरों की उम्रें	८८
९-योनि-परिवर्तन	३३	२९-जानवरों की चाल	९७
१०-दवाओं में जानवर	३५	३०-अँधेरे में रहने वाले	
११-विषेले जीव	३६	जीव	९८
१२-पूँछ आदमी की और		३१-जानवरों के रंग	१०१
दूसरों की	३८	३२-जानवरों का स्वभाव	
१३-बिलक्षण दैत्याकार प्राणी	४२	और आने वाली बातों	
१४-जन्तु-जगत के बौने	४३	को जानने की शक्ति	१०७
१५-फेफड़े और विना फेफड़े	४६	३३-पक्षियों का वैज्ञानिक	
१६-देखने वाली आँख के		विश्लेषण	१०९
चमत्कार	५०	३४-साँप और उसके शव	११४
१७-कान और सुनना	५३	३५-जानवरों का गर्भकाल	११६
१८-मस्तिष्क और भावना	५६	३६-जानवरों की पूछें	
१९-जानवरों में दैत्य	६१	और उनका प्रयोग	११७
२०-जन्तुओं में युद्ध	६४	३७-प्राणी-राज्य के प्रेत कर्म	
२१-हाथ और पैर	६८	करने वाले	११७
२२-प्रकाश उत्पन्न करने वाले	३८	३८-कुछ फुटकर वातें	
जानवर	७१	शब्द कोश	११९
		१२१-१२८	

जन्तु-जगत के जौहर

डिम्ब

समस्त जीवन एक अण्डे से प्रारम्भ होता है। वृक्ष के अण्डे को बीज कहते हैं। मेढ़क, कुत्ते और मनुष्य के अण्डे को रज-डिम्ब का नाम दिया जाता है, किन्तु हैं सब अण्डे ही, यद्यपि अण्डा शब्द का प्रयोग साधारणतः जीव-जाति की प्रारम्भिक अवस्थाओं में ही किया जाता है। जीवधारियों के अण्डे संख्या, आकार और रूप में बड़ी विभिन्नता रखते हैं। कुछ आदि जीवधारी अपनी नसल को जारी रखने के अन्य प्रकार के एक तरीके पर निर्भर करते हैं। जैसे समुद्री-फल, सितारा मछली—जिसके बाहु के सद्वश पाँच-सात अंग होते हैं—और कुछ कृमि, अंग-भंग करने से बढ़ते हैं। काटे हुये अंगों के टुकड़े नवीन व्यक्ति बन जाते हैं। प्रत्यक्ष विनाश की क्रिया ही से उनकी जाति फूलती-फलती है। किन्तु किसी जीव का संसार में प्रवेश साधारणतया किसी न किसी प्रकार के डिम्ब ही के द्वारा होता है।

आरम्भ में—

मानव डिम्ब एक हड्डी का सौबाँ हिस्सा होता है। इस प्रकार एक शहर की सारी आबादी मुर्गी के एक अंडे के भीतर समा सकती है। एक मुर्गी के पेट में बोसों अंडे होते हैं जिनका आकार एक सुपारी से लेकर एक तिल के दाने के बराबर तक होता है।

लाखों अंडे—

जीवन की सीढ़ी में जितना जीचे हम उतरते जायेंगे उतना ही हमको सालूम होगा कि अंडे अत्यन्त उदारता से उत्पन्न किए जाते हैं। कोई-कोई अमेरुदण्डी (बिना रीढ़ वाले) जीव लाखों अंडे देते हैं। मेरुदण्डी जीवों में “लिंग” नामक जीव अत्यन्त बहु-प्रसव होता है, वह १६ करोड़ अंडे देता है। ‘स्टिकिल वैक’ नामक मछली जिसकी पीठ की हड्डी बड़ी तेज़ होती है, केवल कुछ कोड़ी अंडे देती है, जिसका रक्षा नर करता है और उन्हें सेते-सेते अपने को समाप्त कर देता है। अनेक सरीसूप अपने अंडे रेत में अथवा सड़ने वाले पदार्थों में गाढ़ देते हैं और सूर्य की गरमी से बे परिपक्व हो जाते हैं।

बुद्धि का युद्ध—

मनुष्य का बच्चा दस सप्ताह की आयु में भी असहाय रहता है, किन्तु हिंदू का बच्चा दस धंटे ही में फुटकने लगता है और साँप के जो बच्चे जीवित पैदा होते हैं वे दस मिनट ही में स्वावलम्बन का पूर्ण चित्र उपस्थित कर देते हैं।

थैले वाले जीव—

प्रारम्भिक रूपायी जीवों में अपने शरीर में अपने बच्चों का पालन करने का कोई उपाय न था। वे भी उसी प्रकार अपने अंडे रखते थे जैसे कि सरीसूप करते थे। आस्ट्रेलिया के थैले वाले जीव अपने-अपने अंडों को अपने शरीर के भीतर से स्थानान्तरित करके अपने थैले में रख लेते हैं। यहाँ से बच्चे अपनी माता के रूपों के अग्र-भाग से दूध पीते हैं। कांगारू अपने बच्चे को नौ महीने तक इसी थैले में रखे हुये फिरा करती है। इसके पश्चात् एक साल तक बच्चा किसी घटना विशेष पर उक्त थैले अपनी सुरक्षा का सुगम स्थान समझता है।

जीव-निर्माण—

जीव-निर्माण का समय मात्रा-पिता के आकार पर निर्भर रहता है। मुर्गी का अंडा २१ दिन में तैयार हो जाता है किन्तु हँस के अंडे को इससे दूना समय लगता है। मनुष्य को विकसित होने के लिए गर्भाधान और जन्म होने के बीच में नौ मास लगते हैं। किन्तु आकार की बडाई-छुटाई का यह नियम हाथी और जिराफ पर लागू नहीं होता। क्योंकि यद्यपि वे मनुष्य से आकार में कई गुना बढ़े होते हैं, फिर भी उनके बच्चों को गर्भकाल में मानव बच्चे से केवल दुगुना ही समय लगता है। अतः उच्चकोटि के जीवों को बनने के लिये अधिक समय की आवश्यकता होती है।

भोजन

किसी जीव की प्रकृति कैसी भी हो उसे भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के द्वारा प्राप्त होता है। चाव और शेर ऐसे मांसाहारी पशु भी कार्बन (अंगारक वायु), आक्सीजन (प्राण-वायु) और हाइड्रोजन (उद्धन) के सहरा पोषक पदार्थ अप्रत्यक्ष रूप से अपने शाकाहारी शिकार से प्राप्त करते हैं।

खाने के अनेक फ़ूँ

जिस प्रकार प्रारम्भ से नीबन एक सीधी खी दात थी उसी तरह भोजन करना भी मिलुल मरुल काम था। “एमीना” सरीखा एक-कोषीच जीव जो जल और धूतों से पाया जाता है, अज्ञरशः अपने भोजन के चारों ओर लिपट जाता है। अत्यन्त भर्ती शक्ति प्राप्त करके वह किसी भोज्यकण के इंट-गिर्द छह

समय तक बहता रहता है जब तक कि विजातीय शरीर स्वयं उसके शरीर का एक आवश्यक अंग नहीं बन जाता। कुछ प्रारम्भिक जीव अपने हिलने वाले दाँतों के द्वारा अपने भोजन को अपने में सातम कर लेते हैं। भोजन करने का यह ढङ्ग जन्तु-जगत का कुछ उच्च श्रेणियों में भी साधारणतया अद्वितीय रूप से किया जाता है।

१४१७५ दाँत वाला घोंघा—

जन्तु जीवन की दौड़ में दाँत को क्रम-वृद्धि बाद की चीज़ है। अमेरुदण्डी जीवों में दाँतों का काम अनेक अन्य प्रकार के उपायों से लिया जाता था और अब भी लिया जाता है। गुबरीला, चींटी या केकड़े के दाँत और जबड़े वास्तव में उनकी टाँगें हैं जो आकार के अनुसार रूपान्तरित हो गई हैं। केकड़ों और झींगा मछली ने इसकी पूर्ति अपने उदर को भीतरी दीवालों को कठोर बना कर, कर ली है, जो चक्की के पाटों की तरह एक दूसरे के ऊपर रगड़ा करती हैं। कुछ समुद्रों घोंघों में जो अन्य प्रकार के घोंघों और सीपों आदि को निगल जाते हैं, इस प्रकार के अङ्ग बन गये हैं। कुछ घोंघे एक प्रकार की आरी से अपने भोजन को कुतर लेते हैं। बगीचों में रहने वाले घोंघों के इस प्रकार के १४१७५ दाँत १३५ कतारों में होते हैं। अष्ट-पद और स्कुइड नामक उस मछली में जो चारे के बजाय इस्तेमाल की जाती है, दाँतों ने घने होकर दो भागों की एक नोकीली चोंच का रूप धारण कर लिया है, जो तोते की चोंच से बहुत कुछ मिलती-जुलती है।

कभी चिड़ियों के दाँत थे—

दाँतों के पहले जबड़े बने, फिर शार्क मछली, के-से दाँत हुए, इसके पश्चात् वास्तविक दाँत। सरीसूपों के दाँत एक

सीधी रेखा में जबड़े की हड्डी की सारी लम्बाई में होते हैं। इसी तरह के दाँत किसी समय आदिस चिड़ियों में होते थे।

मनों वज्जन के दाँत—

स्तनपायियों में दाँत उस जीव की मुख्य चीज़ बन गये हैं। सरीसृप के सारे दाँत एक ही तरह के होते हैं; किन्तु प्रत्येक स्तनपायी के दाँत तीन प्रकार के होते हैं—खुथरने वाले, फाइने वाले और पीसने वाले। प्रत्येक प्रकार में भी विचित्र विभिन्नता पाई जाती है। खुथरने वाले दाँत, उदाहरणार्थ हाथी के ऊँकीले वाहरी दाँत बन जाते हैं, जो कभी-कभी १० फुट लम्बे तक हो जाते हैं और जिनमें प्रत्येक का वज्जन आधे टन तक होता है। उत्तविलाव में ये ही खुथरने वाले दाँत जबरदस्त लकड़ी काटने वाले बन जाते हैं और एक कांगारू में ये एक कैंची का काम देते हैं, किन्तु हमारे लिये यह दाँत एक कमज़ोर खुथरने वाले औज़ार स्वरूप हैं जो केवल मुलायम पदार्थों ही में उपयोग किये जा सकते हैं।

चीटी-भक्षियों ने अपने दाँत विलकूल गिरा दिये हैं किन्तु बचपन में उनके कुछ दाँत होते हैं। समस्त दाँतों के रूपान्तरों में सौंप के ज़हरी दाँत वड़े ही विचित्र होते हैं। वे बदल कर त्वचा की भीतरी तह में ढालने वाली पिचकारी बन जाते हैं जो विभिन्न शक्ति का विष शरीर में प्रवेश कर देती है और यह सारा विष मुँह की लार ही से उत्पन्न कर लिया जाता है। आमतौर से हम दाँतों का काम चर्वण ही समझते हैं, किन्तु बहुत प्रारम्भिक दाँत चवाने के अयोग्य होते हैं, उनका प्रथम कार्य होता है जीवित भोजन को पकड़ना और उसे बचकर भाग जाने से रोकना। ऐसे दाँत मछलियों और सरीसृपों में होते हैं। कुछ मछलियों के पीसने वाले दाँत होते हैं और वे इतने छढ़ होते हैं कि फठोर घोघा या चिप्पा को पीस डालते हैं, किन्तु सुख्यतः

शिकार साबित ही निंगल लिये जाते हैं। मछलियाँ चक्कते-फिरते जीवित जाल होती हैं, और कीड़े, कौड़ी और बड़े-बड़े पत्थर आदि जो उन्हें मिलते जाते हैं उन्हें खाती जाती हैं।

मछलियाँ और सरीसूपों के दाँत गते की ओर मुड़े होते हैं। यही कारण है जो हमें साँप की निंगल जाने वाली लीलाओं से चकित करता है। देखा गया है कि एक साँप दूसरे उस साँप का साक निगल जाता है जो एक चूहे को निगलने का प्रयत्न करता होता है। साँप के मुँह में जो कुछ भी जाता है उसे वह उगल नहीं सकता।

गहरे समुद्र में रहने वाली एक मछली जिसे “काली निंगल” कहते हैं, इतना खाने वाली होती है कि वह अपने शरीर से ५ या ६ गुना भोजन निंगल जाती है। अपने अधिक सुक्ष्मदृष्टिके कारण उसे अपने शिकार का पीछा करने में अक्सर पानों के ऊपर आना पड़ता है, जहाँ एक समुद्री विडिया शिकार और शिकारी दोनों को समाप्त कर देती है।

चिपका लेने वाली जीभ—

उच्च रचना के कुछ जीव दाँतों से मुक्त होते हैं। सारे पक्षी दन्तहीन होते हैं। वे अपने भोजन के साथ जो गर्द और बालू निंगल जाते हैं वह उनके लिये वही काम करता है जो १० पैर वाली मछली के लिये तीन दाँत वाली पेट की चक्की करती है। चीटी-भक्षी और कठफोड़वा के समान कुछ थोड़े से जन्तु ऐसे होते हैं जिन्हें भोजन संप्रह करने का सहारा केवल अपनी जीभ पर होता है। ऐसी लम्बी और शक्तिशाली जोनों को जड़ें बहुत असाधारण होती हैं।

बहुत सी जीभें तो जीभ वाले के तालू के पीछे जुड़ी रहती हैं, चीटी-खोरे की जीभ का लंगर उसकी छाती को हट्ठो में

लगा रहता है, और कठफोड़े की जीभ उसके कानों के पीछे से होकर सिर को पार करके उसका आँखों से जुड़ा रहता है। यदि बालों की जीभों में कदाचित् सबसे विवित्र जीभ गिरगिटान की होती है। उससे कोड़ों को चिपका लेने का काम लिया जाता है। गिरगिटान अपनी जीभ को अपने सारे शरीर की लम्बाई से भी अधिक दूर तक निकाल कर कीड़े-मकोड़ों को उसमें चिपका कर ले आता है।

सिकुड़ने वाले एक अजगर ने ४ वर्ष तक कुछ नहीं खाया —

खाने का उल्टा भूखे रहना है, और यद्यपि कोई जीव अनिश्चित काल तक भूखा रह कर बच नहीं सकता, तो भी सहन-शक्तियों से बड़ा अन्तर होता है। पेरिस के चिड़ियाघर में एक सिकुड़ने वाले अजगर ने सबको मात कर दिया जो पूरे चार वर्ष तक बिना कुछ खाये हो जोशित रहा।

साधारणतया पशु स्वयं अपनी चर्बी पर निर्बाह करके अकाल के समय को पार कर देते हैं। ऊँट इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। मिश्र की महाभूमि के चूड़े और एरांजोना को जहरीलो छिपकली या विस्तुइया के समान कुछ अन्य जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी पूँछ में चर्बी का एक बड़ा संचित कोष रखते हैं। ऊँट को तरह ये भो दीर्घकालीन भूख में बिल-कुल चुस्त-चालाक बने रहते हैं। साधारण ढङ्ग यह होता है कि सुकाल के समय जो चर्बी एकत्रित की जाती है वह धार निद्रा में लिप्त होकर धीरे-धोरे खर्च की जाती है। इसका सुन्दर उदाहरण जंगली चूहा है जो पतझड़ में एकान्तवास प्रहण कर लेता है और अगली वसन्त ऋतु में दुबला किन्तु अनुकूल अवस्था में बिलकुल ठीक-ठाक निकल आता है।

साधारण मेढक के चिपच में अनेक कहानियाँ हैं किन्तु वह एक साल से अधिक बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। उसकी सहनशक्ति मस्खूमि के घोघे से बहुत कम होती है जो ढाई वर्ष तक चिपका रह कर वृद्धिश अजायबघर में जीवित देखा गया है। इस समय के बाद “मुर्दा घोघा” जागा और जब उसे गर्म स्नान कराया गया और भोजन भेट किया गया तब उसने छड़ी दिलचस्पी प्रकट की।

गति के अनेक रूप

मेहदरडी जीवों के आगमन के पूर्व गति के अनेक रूप प्रकट हो चुके थे। कस्तूरा मछली और जेली अर्थात् मुलायम शरीर वाली भींगा मछली की चाल को उत्तराना कहना चाहिए क्योंकि उनकी गति का कोई उद्देश्य नहीं होता। कुछ कृमि गति को और आगे बढ़ाते हैं और अपनी बक्र तरंगों से सर्पों और मछलियों का अनुकरण करते हैं। बाद में उत्पन्न होने वाले घोघे या सिप्पी और पतली मिल्ली वाले जीव उड़ना छोड़ कर यात्रा के सब ढङ्गों का प्रयोग करते हैं।

पहले समुदाय के जीव जिसमें सितारा मछली और समुद्री साही होते हैं—ट्यूबदार पेरों और पोली टॉगों की एक विचित्र पद्धति का प्रयोग करते हैं। इन ट्यूबदार पेरों की सहायता से सितारा मछली अपने को उलट जाने पर सीधा कर लेती है, कस्तूरा मछली के कवच को खोल डालती है और किसी भी और सरलता से यात्रा कर लेती है। समुद्री साही अपनी गोलाकार खाल के समत्त भागों से ट्यूबदार पेर बाहर निकाल लेती है, और प्रत्येक अवस्था में सीधी ही रहती है।

पीछे चलने वाले जन्म—

घोंघा अपने एक बड़े पैर पर फसलता हुआ चलता है। रेत को काफी गहराई तक खोदने में घोंघे इसी तरह के अंगों का प्रयोग करते हैं और लकड़ी तथा मुलायम पत्थरों में सुरंग बनाते हैं। कुछ भोटी की तरह के जानवर या सीपी जैसे सुनुद्रो-खरहा पानी में उसी तरह फड़फड़ा कर चलते हैं जैसे पक्षी हवा में करते हैं। अष्टपद ने, जो सारे वोंघों में सबसे बड़ा होता है, अपने पैरों को आठ चक्सने वाले हाथों में विभक्त कर लिया है। इन्हीं आठ हाथों की सहायता से वह सकड़ी के समान चलता है। जब दबता है तब वह अपने हाथों को सिकोड़ लेता है और अपनी टेढ़ी नली से पानी निकाल देता है, और तेजी से पीछे की ओर झपटता है।

सरीसूपों ने उभचरों को पीछे क्यों छोड़ दिया—

न्यूल पर रहने वालों की उन्नति के लिये फेफड़ों का होना आवश्यक था। सरीसूपों में फेफड़े होने के कारण उन्होंने टेढ़ी-मेढ़ी आकृति के उभचरों को अपने से बहुत पीछे छोड़ दिया। एक कछुआ धरती से अपने शरीर को उठा सकता है किन्तु उसके अंग वैसे हो जाते हैं जैसे कि कसर पर हाथ रखने से कोहनियाँ बाहर की ओर हो जाती हैं। इससे उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। स्तनपायी अपने घुटनों और कोहनियों को अपने शरीर के साथ एक रेखा में ले आते हैं, इससे उनका बजून बँट जाता है और उन्हें चलने में विशेष प्रयत्न नहीं करता पड़ता है। गतिमान मछली के प्रथम प्रयत्न से सीधे होकर चलने वाले मेरुदण्डी जीव की चाल तक पहुँचने में १,०००,०००,००० वर्ष लग गये।

पूँछ बज़न को स्थिर करने वाले डण्डे का काम करती है—

मनुष्य के सिवा और कई जीव ऐसा नहीं कर सकता। मनुष्य के सदृश्य जनमानुष केवल कूबड़ निकली हुई डगमगी चाल का प्रयत्न करता है। कुछ जानवर अपने हाथों को बज़न स्थिर करने वाले डरांडों के तौर पर प्रयोग करते हैं, किन्तु सब ही को चारों हाथ पैरों से चलने में सुख मिलता है। सनुष्य की नकल करने वाले समस्त दूसरे जानवरों को अपनी पूँछ को पसंदे की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। जिनां इस प्रकार की सहायता के कांगाल और आट्टोलिया की भालरदार छिपकलों लुढ़क कर आगे नाक के बल गिर पड़ेंगे। उनकी सहायता के लिये उनकी पूँछों के होते हुए भी सीधे रहने के लिये उन्हें जलदी-जलदी चलते ही रहना पड़ेगा। हल्का शरीर होने के कारण चिड़ियों को कम लकावट का सामना करना पड़ता है। और उनके पंजों के पर्याप्त फैले होने के कारण उन्हें दृढ़ता से जमने का स्थान मिल जाता है।

समस्त चौपाए चक्रगतिकारी या कोण जै चलने वाले होते हैं। हम सीधे होकर चलते हैं किन्तु हमारे हाथ अपने आप गति करने लगते हैं जो उस समय की एक गँज (प्रतिध्वनि) है जब कि हम कम सीधे होकर चलते थे। हम अपनी चाल में अपने अंगों को आमने-सामने के कोनों से झुजाते हैं। किन्तु एक कुत्ता एक समय में अपने एक ही अंग को इस्तेमाल करता है। और वारी-बारी से सबको चलाता है।

लौट कर पुनः समुद्र में जाने वाले जीव—

जीव-प्रगति का एक जक्षण यह है कि उनकी गति समुद्र की ओर लौटने की है। जीवन पानी में प्रारम्भ हुआ था किन्तु अन्त में अनेक जीव पानी छोड़ कर पृथ्वी पर आ गये। थोड़े

से लौट भी गये। इसके उदाहरण समुद्री-शेर और ह्वेल हैं। दोनों माँसाहारी स्तनपायी हैं। समुद्री-शेर माँसाहारी भेड़िये और भालू से बहुत कुछ मिलता-जुलता। बना हुआ होता है। आचीन अस्थि-पंजरों के देखने से पता चलता है कि ह्वेल भी एक बृहत् माँसाहारी जाव को सन्तान है, जो अपने पूर्वजों से बिल-कुल नहीं भिलती। या तो भोजन की खोज में, या किनारे के बड़े शब्दुओं से बचने के अभिप्राय से ह्वेल के पूर्वज पानी में इसलिये लौट गये कि उन्हें वहाँ वह खतंत्रता प्राप्त हो जो उन्हें धरती पर नहीं पिलती थी। उनका उद्देश्य चाहे जो कुछ रहा हो, वे इस बात का एक दुखद उदाहरण हैं कि वे एक आकृत से निकल कर दूसरी आकृत में फँस गई। भनुष्य अपने अच्छ-शब्दों और गोली बाल्ड से किसी समय की इस बलवान जाति का नामोनिशान मिटाये दे रहा है। केवल उनका थोड़ा-सा अयोग्य अवशेष अंश बच रहा है।

जानवरों की चाल—

सोटरकार और वायुयान आदि अनेक सशोनों ने जानवरों की चाल में बाधा उपस्थित कर दी है। केवल थोड़े से ऐसे कीड़े-सकोड़े हैं जिनके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि उनकी चाल हवाई-जहाज के बराबर है, किन्तु बाज और गहड़ की तरह विभिन्न पक्षी हैं जो १७० और १८० सील प्रति घन्टा के हिसाब से उड़ सकते हैं।

धरती पर कोई ऐसा जानवर नहीं है जो चीते या शिकारी तेंदुए की चाल की बराबरी कर सके। उनकी चाल ६० मील प्रति घन्टा होती है। धरती पर की सांती तेज़ चाल केवल थोड़े ही क्षासलों तक जारी रह सकती है। कोई आदमी तेज़ी से ३० मील प्रति घण्टा से अधिक नहीं दौड़ सकता है और न ७० मील

प्रति घन्टा के हिसाब से अधिक वाइसिकिल चला सका है। पानी में चाल और भी धीमी हो जाती है। अब तक जो अधिक से अधिक तेज़ चाल जाँची गई है वह 'टर्नी' नाम की भछली की ४० मील प्रति घन्टा के हिसाब से देखी गई है।

भछलियों का स्थानान्तर गमन—

आर्थिक दृष्टि से जानवरों की यात्रा का महत्व उस आर्थिक या छमाही गमनागमन से है जिसे स्थानान्तरित होना कहते हैं। इन्हीं गमनागमनों पर भछलियों और अन्य भद्यों की क्षसल प्राप्त होती है। इन गमनागमनों के प्रति कुछ मिथ्या विश्वास भी प्रचलित हैं। कुछ लोग चिड़ियों के उड़ान और भछलियों तथा कोइ-मकोड़ों की यात्रा से शुभाशुभ की बातों को जोड़ देते हैं। कुछ भछलियों का आगमन समुद्र की लहरों से सम्बन्धित होता है या किन्हीं भौतिक परिवर्तनों से, जैसे ऋतु-परिवर्तन आदि।

क्या चिड़ियाँ किसी निश्चित मार्ग से जाती हैं ?—

चिड़ियों का उड़ान बहुत करके ऋतुज हवाओं की दया पर निर्भर करता है और उसका सम्बन्ध किसी निश्चित मार्ग से क़तई नहीं होता। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि चिड़ियों के निवास-स्थान पर अधिक ठंडक होने से उन्हें अपने नाश होने का भय होने लगता है अतः वे उस स्थान को छोड़ कर गर्म स्थानों को चली जाती हैं और जब ठंड कम हो जाती है तब अपने मूल-स्थान को लौट आती हैं।

बच्चे देने के लिये समुद्र पार किये जाते हैं—

घरेलू मकड़ी के समान हुछ जीव गजों की दूरी में स्थानान्तरित होते हैं; किन्तु इवार्बाले सहार्दीपों को पार करती हैं।

दूरी चाहे जितनो हो, स्थानान्तर गमन का मुख्य कारण भोजन और वैवाहिक आवासों की प्रेरणा ही होती है। भोजन ही जलन्वयालों को लाखों की संख्या में ३००० हजार मील एटल टिक महासागर के पार सारगोसा समुद्र से योरप में भोजन की कमी ही केनाडा के जंगली बारहसिंहों को लगातार देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिये बाध्य करती है। अमरीका के धीरे-धीरे चलने वाले 'स्लथ' नामक चौपाई को १०० फुट ऊँचे पेड़ों की चोटियों पर चढ़ने की प्रेरणा केवल "भावनाओं" ही से मिलती है।

जीव-जन्तु और समाज

अनेक प्रकार की छोटी-छोटी छिलकेदार मछलियाँ अबोवे संख्या में इतने अधिक होते हैं कि वे मीलों तक खुले समुद्र का रंग बदल देते हैं। टिड़ियों के दल सूरज के प्रकाश को छिपा लेते हैं और पृथ्वी के बड़े-बड़े मैशानों को ऐसे ढक लेते हैं मानों कि किसी ने एक बड़ा कम्बल तान दिया हो। कई स्थानों पर मछलियाँ इतनी संख्या में पाई गई हैं कि जहाजों का रास्ता रुक गया है। मिनगे या तितली के पहल रूप इतने इकट्ठे हो गये हैं कि उन्होंने रेलगाड़ियाँ रोक दी हैं और सड़कों की आमदरक्षत बन्द कर दी है। लेकिन एक तरह के जानवरों के इन बड़े-बड़े जमघटों में से किसी को भी समाज नहीं कह सकते। समाज का अर्थ केवल एक से अधिक जीवों का एक स्थान पर जमा हो जाना ही नहीं है बल्कि संख्या के अतिरिक्त और भी कुछ है। एक तरह का समाज शहद की मक्कियों, बराँ और चींटियों के समान कीड़े-मकोड़ों द्वारा उपस्थित किया जाता है किन्तु ध्यान से देखने पर यह विदित होता है कि इनकी सह-

योगी स्थाएँ भी मानव-समाज से तनिक भी नहीं मिलतीं, कम से कम उनमें जनसत्तात्मक नींव तो कोई होती नहीं। मानव-समाज और कीड़े-मकोड़ों की संस्थाओं में जो समानता दिखलाई जाती है वह एक और का अपुर्ण ज्ञान और दूसरी और के प्रति पूरा अज्ञान प्रकट करती है। यदि कोई चींटी जखमी हो जाती है तो उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है और उसका कोई भी साथी उसकी तनिक भी परवा नहीं करता और न कुछ सहायता ही पहुँचाता है। आश्चर्य की बात है कि यदि चींटियों के सामने मिठाई रख दी जाय तो वे अपने प्रेम-पालित बच्चों को खतरे में डाल कर मिठाई खाने लगती हैं। वे मिठाई के सामने अपने बच्चों को लुटेरों की भेट कर देती हैं और उनकी तनिक भी परवा नहीं करतीं। यही हाल शहद की मक्खी के एक श्रभिक का होता है। उसे कीट कोष से निकलते ही, विनाशिका के, स्वयं अपना काम आ जाता है। कोई चींटी अपने काम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती। यदि जखमी होकर वह बेकार भी हो जायेगी तो भी वह अपने उस काम को उसी तरह करती रहेगी जैसे कि एक चाभी भरा हुआ खिलौना। यद्यपि कीड़े-मकोड़ों के समाज और हसारी समाज में कुछ ऊपरी समानता अवश्य दिखलाई देती है, किन्तु वह युगों से वैसी ही चली आई है और सम्भवतः आगे भी अन्त तक ऐसी ही चली जायगी। उसमें न किसी सुधार की और न किसी प्रकार की उन्नति की आशा है।

समाज किसी भी या परिश्रम करने वाले समूह का नाम नहीं है। किन्तु वह तो है सर्विष्कों का एकीकरण और शक्ति के साथ आपस का मेल-जोल और सहानुभूति। मछलियों और पानी के पित्तसुओं की बड़ी से बड़ी संख्या में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती। ऐसे जीवों की संख्या किसी एक विशेष स्थान

पर केवल बहुतायत से पैदा होने के कारण बढ़ जाती है। बहुधास्त इनकी बहुतायत ही इन सब को बाहरी शत्रुओं का लक्ष्य और भीतरी लीभारी का शिकार बनाती है।

जानवरों में नेता होते हैं—

समाज का प्रारम्भ कुदुस्त्र से पैदा होता है। कई कुदुस्त्रों का एक संघ में एक साथ सूत्र-बछड़ कर देना वास्तविक समाज का श्रीगणेश है। उनमें आपस में सबकी भलाई के लिये सहिष्णुता और एकता होना आवश्यक है, इस कार्य के लिये बुद्धि की आवश्यकता होती है, अतः केवल उच्चकोटि के जीवधारियों में ही समाज के दर्शन हो सकते हैं। पक्षियों में समाज के लक्षण दिखाई देते हैं, किन्तु उसका पूर्ण विकसित स्वरूप उच्चकोटि के स्तनपायियों में प्रकट होता है। अपने भुन्ड के बाहरी भाग पर रहने वाली बतख जब किसी लोमड़ी को गल्ले के पास आते देखती हैं तो अपने साथियों को खतरे की सूचना देती है। परन्तु कोई सामाजिक कीड़ा-मकोड़ा नहीं ऐसा करता। चिड़ियों में सांखाप की-सी फिक्र होती है, वे लुन्दर घर घनाती हैं और वे बहुधा 'प्रेस्पूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध में बँध कर' रहना भी जानती हैं; किन्तु वे उस तरह के मेल-जोल के लाभों को नहीं अनुसन्ध करतीं जैसा कि भेड़ों, खेड़ियों और बन्दरों में देखा जाता है।

प्रायः सब प्रकार के चौपाये एक भुँड बनाकर रहते हैं और यदि उन पर आक्रमण होता है तो वे एक विधिपूर्वक ढंग से आक्रमणकारी का सामना करते हैं। वे एक चौकोर व्यूह बनाते हैं, जो बीच में पोला होता है और बाहर की ओर नर खड़े होते हैं और अपने शत्रुओं के लिये अपने सींग तैयार रखते हैं। चिड़ियों के बिल्कुल विपरीत, स्तनपायी अपने नेता या सरदार की आज्ञा पालन करते हैं और उसकी क़द्र करते हैं।

कुछ पशुओं में तो मालूम देता है कि जनता की सभा के-से साधारण नियम भी होते हैं। भेड़ियों के झुएड़ का एक मुखिया होता है जिसकी आज्ञा सबको माननी पड़ती है और यदि कोई आज्ञा नहीं मानता तो उसके साथी उसे सरदार की आज्ञा मानने के लिये बलपूर्वक बाध्य करते हैं। हाथियों का भी एक सरदार होता है जो सदा झुएड़ के आगे-आगे चलता है। हाथियों में सबसे बलवान ही सरदार हो सकता है। इनमें कभी-कभी सरदारी के लिए दो बलवान हाथियों में युद्ध भी होता है और जीतने वाले को सारा झुएड़ अपना सरदार मानने लगता है।

इससे भी बढ़कर मनुष्यों की-सी समाज बन्दरों और बन्मानुषों में देखी जाती जाती है। कई कुदम्ब मिल कर एक बड़ा झुएड़ बना लेते हैं और उन सब पर शासन करने वाला एक सरदार होता है। उनके अलिखित क्रान्तून बड़े कठोर होते हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार घियों का बँटवारा होता है, बच्चों को ठीक मार्ग पर लाया जाता है और जिह करने पर उन्हें सजा दी जाती है।

बन्दर अपने बच्चों की रक्षा में बड़े सतर्क रहते हैं। वे पहले खुद अन्न चबा-चबा कर बच्चों को देते हैं। उनकी बाल-रक्षा की सतर्कता के दो उदाहरण यहाँ पर निजी अनुभव के आधार पर लिखता हूँ :—

(१) एक बार एक बन्दर का छोटा बच्चा कानपुर की ठण्डी सड़क पर एक साइकिल से कुचल गया और ऐसे जोर से चिल्लाया कि आस-पास के सारे बन्दर जमा हो गये। बाइ-सिकिल वाला तो साइकिल भगाकर चला गया किन्तु थोड़ी देर तक उन सारे बन्दरों ने रात्ते वालों का निकलना मुश्किल कर दिया। किसी की क्या मजाल थी कि सड़क के एक ओर से

दूसरी ओर को चला जाता । वे एक कुचलने वाले मनुष्य के बदले सब आदमियों को अपना शत्रु समझने लगे थे और उन पर खाँव-खाँव करके झपट पड़ते थे । तनिक ही देर में काफी भीड़ जमा हो गई और शायद भीड़ की अधिकता ही देखकर ओड़ी देर बाद बन्दर चल दिये ।

(२) एक दिन बन्दर का एक बच्चा मेरे मकान (पटकापुर) में एक कमरे में घुस गया और दूसरी ओर से सीखों के द्वारा निकलने का प्रयत्न करने लगा । जब नहीं निकल सका तो उसने एक विशेष प्रकार की आवाज की, जिससे आस-गास के बन्दर आने लगे । मैं यह देख वहाँ पहुँचा और उसको कमरे से भगाने की कोशिश करने लगा । इतने ही में उसने ऐसे जोर की चीख मारी कि सारे बन्दर वहाँ जमा हो गये । इतना अच्छा हुआ कि वह बच्चा कमरे से बाहर हो गया था और मैं भीतर रह गया था । तो भी वे बन्दर किंवाड़ों को भड़भड़ाते थे और ढकेल कर भीतर घुस आना चाहते थे और मुझसे अपने बच्चे का बदला लेना चाहते थे । इतने ही में मेरा बहरा नौकर मोहन कहार बाहर से आ गया और ऊपर आ रहा था कि मैंने उसे आवाज़ देकर कहा कि “लाठी लेकर ऊपर आना । यहाँ बहुत से बन्दर जमा हैं ।” किन्तु वह बहरा था वह मेरे सबसे छोटे पुत्र शिवाजी को कंधे पर बैठाये हुये ऊपर दनदनाता हुआ चला आया । इतने में दो-चार बन्दर उसके पैरों में चिपट गये । मैं भी निकल आया और बड़ी मुश्किल से उन्हें भगाने में सफल हुआ ।

जवान बन्दरों को अनुशासन में रखा जाता है । यदि भय के स्थान से कोई बुड़ा सदृश्य हट जाता है तो दूसरा बलबान साहस के साथ उसका स्थान ग्रहण करता है । उनमें से कुछ तो

कभी-कभी बढ़िया चालाकी और सुन्दर दाँव-पेंचों से काम लेते हैं और एक दूसरे की सहायता को हरदम तैयार रहते हैं।

बन्दरों की संगठन-शक्ति का नमूना इस प्रकार देखा गया है :—

कानपुर के फूल बाग में बन्दरों के दो दल आते हैं। दोनों की सीमाएँ सुकर्रर हैं। एक दल दूसरे की सीमा में नहीं जाता। एक बार मैंने देखा कि एक दल ने दूसरे दल को बहुत दूर तक खदेड़ दिया। भागने वाला दल काफी दूर तक अपनी सीमा में पीछे हटता गया और आक्रमणकारी दल घुसता गया। जब पीछे हटने वालों का नेता, जो एक हाथ वाला डुण्डा था और जो अब तक सबके साथ नहीं था, कदाचित् कहीं गया था, आया, तो उसने ललकार कर आक्रमणकारी दल पर ऐसे जोर से अपने सब साथियों को प्रोत्साहित करके धावा किया कि उन्हें भागते ही बना, और जब तक वे उसके दल की सीमा के बाहर नहीं निकल गये डुण्डा अपने साथियों के साथ उन्हें खदेड़ता ही गया। बन्दरों के दलों में अक्सर लड़ाइयाँ भी होती हैं और लोग जमाहोकर इन लड़ाइयों को देखा करते हैं।

ये बातें चींटी आदि अन्य कीड़े-मकोड़ों में नहीं पाई जातीं। जब इनके बिलों पर आक्रमण होता है तब वे घबड़ा जाती हैं और रक्षा के फुटकर उपाय काम में लाती हैं। पशु-विज्ञान विशारदों का मत है कि बन्दरों का समाज खूब संगठित होता है और मानव-समाज से मिलता-जुलता है। उनके संगठन की मिसाल जिब्राल्टर के पुराने कागज-पत्रों के देखने से मिलती है, जहाँ बन्दरों की किसी समय एक पार्लीमेंट थी।

पशुओं में परस्पर सहयोग—

जानवरों के समाज में एक विचित्र बात देखी जाती है, वह है विल्कुल असमान जीवों में एक दूसरे के लाभ के लिये उनका

सहयोग । इस सहयोग में उन 'गेट क्रैशर्स' की-सी बात नहीं है जो चीटियों और मधु मकिखयों के घोंसलों में वुसे रहते हैं और जो उनसे पाने वाले लाभों के बदले में कुछ देते भी हैं । उपर्युक्त सहयोग का एक साधारण उदाहरण तपस्वी केकड़ा है, जिसके उभरे हुए सिप्पीदार मँगनी वाले घर में बहुधा अनेक समुद्री फूल चिपके रहते हैं । जब केकड़ा भोजन करता है तब ये समुद्री फूल उन सारे दुकड़ों को झपट लेते हैं जिन्हें वह खुथ-खुथर कर कैकता जाता है । यदि कोई मछली सिप्पी सहित कैकड़े को निगल जाना चाहता है, तो वही समुद्री फूल मर्मभेड़ी ढोरे निकाल कर कैकते लगते हैं, और इस प्रकार कैकड़ों को बचा लेते हैं । अतएव पारस्परिक लाभों का एक बड़ा भारी वास्तविक विनिमय होता है, यद्यपि यह लाभ सदा बराबर के नहीं होते, क्योंकि कुछ समय में समुद्री फूल इतने मोटे और संख्या में इतने अधिक हो जाते हैं कि वे अपेक्षाकृत सिप्पी का ज्यादा हिस्सा ले लंते हैं और कैकड़े को बाध्य होकर ऐसी दूसरी सिप्पी ढूँढ़नी पड़ती है जिसमें कम अतिथि निवास करते हों ।

इसी का एक समरूप उदाहरण मैदानी गिलहरी उपस्थित करती है, जो अमरीका की बिल बनाने वाली एक छोटी सी दंशक है । उसके बिलों पर 'रेटिल स्नेक' (एक प्रकार के सर्प) जिनके चलने पर खड़खड़ाहट का शब्द उत्पन्न होता है) और उल्लुओं का धावा होता है । उल्लू और साँप गिलहरी के और स्वयं एक दूसरे के बच्चों को खाते हैं । वे एक दूसरे के साथ के इच्छुक नहीं होते, उन्हें तो स्वतन्त्रता से मिलने वाले भोजन और आश्रय की चाह होती है । अतः शाकाहारी गिलहरी चंद्रमा की रोशनी में भाग जाने का उपाय ग्रहण करती है और जाकर शान्ति से किसी दूसरे स्थान में उस समय तक रहती है जब

तक कि अनामंत्रित अतिथि वहाँ फिर न आ जायें और उसके कष्ट पुनः न आरम्भ हों।

सेवाओं के बदले में—

अफ्रीका और भारतवर्ष के अनेक भागों में सफेद छोटे प्रकार के बगुले और बन्दर बहुधा वृहदाकार और भयंकर आखेट योग्य पशुओं की पीठ पर सवार होते देखे जाते हैं, किन्तु वे माँसाहारी पशुओं पर कभी भी सवारी नहीं करते।

बुलबुल की तरह की चिड़िया अक्सर निर्भयता के साथ दैत्याकार घड़ियालों के खुले हुये जबड़ों के भीतर-बाहर आती-जाती हुई देखी गई हैं। ऐसी परिस्थितियों में छोटे-छोटे जोवों को उन सेवाओं के बदले में सहन किया जाता है जो वे तंग करने वाले परोपजीवियों को बाहर निकाल कर किया करते हैं।

इस प्रकार का उदाहरण 'रुक' नामक एक प्रकार का कौआ है जो बहुधा भेड़ों की पीठ पर सवार होता है। वह कौआ भेड़ के बालों में से जुएँ और किलनियों को बीन-बीन कर निकाल लेता है और जाइ में जब कि अन्य प्रकार का भोजन मिलना कठिन होता है, न केवल तैयार भोजन सरलता से प्राप्त कर लेता है बल्कि साथ ही साथ गरम विछौते का लाभ भी उठाता है।

पुराने के बदले में नये शरीर

हमारे शरीर लगातार विसर्ते रहते हैं और फिर नये होते रहते हैं। यदि किसी घटना से हमारे शरीर का कोई अंग नष्ट भी हो जाता है तो एक सीमा तक उसकी पूर्ति हो सकती है। आधुनिक चीरफाड़ ने इतनी उन्नति कर ली है कि हाथों या

जंबाओं से मौस लेकर दृश्यनीय ज्ञान और नाकें बनाई जा सकती हैं।

परिवृद्धि को सीढ़ी में जीव जितना ही बड़ा होगा उतना ही कम वह इस चोर्ण्य होगा कि वह क्षीण अंगों की पूर्ति कर सके। कृमि-कीटों के समान सरल जीवों को काटकर यदि दो टुकड़े कर दिये जायँ तो वे अपने को नये सिरे से बना लेते हैं और समुद्री फूल के समान तिन्हींकोटि के जीव तो और भी अपने को व्यवस्थानुकूल बना लेने वाले होते हैं। जब काटकर उनके कई टुकड़े कर दिये जाते हैं, तब उनका प्रत्येक टुकड़ा कुछ समय में एक सम्पूर्ण जीव बन जाता है। एक-कोषीय जन्तु के समान कुछ जीव स्वेच्छा से अपने को दो भागों में विभाजित करके स्वभावतः द्विगुणित होते रहते हैं। सितारा मछलियाँ, जिनके सितारे की तरह पाँच हाथ होते हैं, अपने क्षीण अंगों को फिर से नया कर लेती हैं। ये सिप्पियों को खाती हैं। आजकल इन्हें खाद के काम में लाया जाता है। समुद्री ककड़ियाँ, वास्तव में बड़ी-बड़ी सितारा मछलियाँ होती हैं। इन्हें जब अपच होता है, तब ये अपने समस्त अंतरंग अंगों को बमन कर देती हैं और फिर एक नया समूह उपजा लेती हैं।

क्षीण अंगों को नए सिरे से उपजाना—

खोलदार जानवर—जैसे केंकड़े और भोंगा मछली—अपने क्षीण अंगों को नये सिरे से उपजा लेते हैं, किन्तु यह गति-विधि बड़ी धीमी होती है। जब किसी केंकड़े का पंजा या टाँग जखमी हो जाती है तब वह उस अंग को एक विशेष जोड़ पर से गिरा देता है और कुछ समय तक कठिनाई से जीवन व्यतीत करता है। किन्तु जब दुबारा वह अपना ऊपरी खोल परिवर्तित करता है तब पुराने अंग के स्थान पर एक नया अंग प्रकट हो जाता

यह अंग शुरू में केवल एक नन्हा-सा नमूना मात्र होता है और काम में कम आता है। और इसके पहले कि नया अंग साधारण आकार तक पहुँचे कई खोलों को परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ती है।

अनेक मछलियों की पूँछ का भाग उस समय नष्ट हो जाता है जब वे शिकार खाने वाले शत्रुओं से जान बचाकर भागते हैं। वे नई पूँछें नहीं उपजा सकतीं, किन्तु उनके पिछले और नीचे वाले पखनियाँ या सुकने अन्त में पीछे पहुँच कर मिल जाते हैं और थोड़ा-बहुत पूँछ का काम देते हैं। पीछा किया जाने पर छिपकलियाँ स्वभावतः अपनी दुमें छोड़ भागती हैं। स्नायु-मंडल की शक्ति गिराई हुई पूँछ को ऐसे फड़फड़ाया करती है मानों वह जीवित है। इससे पीछा करने वाले का ध्यान आकर्षित हो जाता है और छिपकली को भाग जाने का अवसर मिल जाता है। कुछ काल में ठूँठ से पूँछ उग आती है और जिस स्थान से पूँछ गिरी थी उस पर एक चिन्ह सदा के लिये बना रह जाता है। यदि पूँछ में केवल चोट ही लग गई है तो घाव के स्थान से अपने आप एक नई पूँछ उगने लगती है। यही दशा अन्य अंगों की भी होती है किन्तु अतिरिक्त अंग, दो-नोंकों वाली पूँछ को तरह सहायता की अपेक्षा रुकावट का अधिक कारण प्रमाणित होता है और ज्यादा हिलने-दुलने के अयोग्य होता है।

यद्यपि गिरगिटान को छिपकलियों की श्रेणी में गिना जाता है, किन्तु वह क्षीण पूँछ को पुनः नहीं उगा सकता और जब एक बार गिरगिटान की दुम नष्ट हो जाती है तब वह अपने शत्रुओं का सरल शिकार बन जाता है।

मांस-बृद्धि--

स्तनपाथी और पक्षी क्षीण अंगों को फिर से नहीं उपजा सकते, यद्यपि उनका क्षीण माँस भर जाता है और दूटा हुआ दौँत उग आता है। लण्डन के जान हंटर (१७२८-१७९३) ने यह प्रमाणित कर दिया है कि माँस में आकार देने वाली प्रकृति है। उनके इस कार्य से आकार की देने वाली जर्राही की नॉच पड़ी है जिसके द्वारा सब प्रकार की भयंकर चोटों की पूर्ति की जा सकती है। आजकल तो उसके द्वारा “चेहरा बदलने” का कुरुपयोग भी किया जाने लगा है।

भोजन के लिये जानवर

जिन जानवरों का माँस मनुष्य के खाने के काम में आता है वे हैं हिरन; गाय, भैंस, सुअर, बकरी, भेड़, गैंडा आदि। कहीं-कहीं शेर का भी माँस खाया जाता है और इस विश्वास से कि इसके खाने से खाने वाले में शेर के कुछ गुण आ जायेंगे। २०० प्रकार की मछलियों में से केवल २० प्रकार को मनुष्य के खाने के काम में आती हैं। कुछ मछलियों के माँस में विषेजे ज्ञार होते हैं अतः उन्हें लोग नहीं खाते।

घड़ियाल के माँस में बछड़े के माँस का सासा स्वाद होता है—

कुछ लोग सरीसृपों को खाने के नाम से बिचकेंगे किन्तु वे भूल जाते हैं कि कछुए का सूप बहुत बड़िया और लज्जीज खाना समझा जाता है। अमरीका में कछुए और क्लिपक्लियाँ बड़े चाव से खाये जाते हैं। मगर और घड़ियाल का माँस स्वाद में बछड़े के माँस के समान होता है। अमरीका और फ्रांस में खाने के लिये मेंढक खूब पाले जाते हैं। किसी-किसी देश में सॉप का

भी माँस खाया जाता है। मेक्सिको में 'एक्सोटोल' नामक एक प्रकार की गोह भी खाने के लिये पाली जाती है। ग्रेट ब्रिटेन में कस्तूरा मछली, घोंघे सदफी मछली, सदफी घोंघा, भींगा, दोशाखा मछली आदि घोंघे, खूब खाये जाते हैं। केकड़ा ताजा भी खाया जाता है और टीन में बन्द करके भी विक्री है।

कीड़े खाना—

सरीसृपों के समान कीड़े-मकोड़े आमतौर से नहीं खाये जाते किन्तु कृमिदाना केक के साथ बड़ी चट्टिया वस्तु समझा जाता है। कोचीनील कृमि दाना छोटे वृक्ष-खटमलों के सुखाये हुये शरीर से प्राप्त किया जाता है। तेल में तलकर टिहुर्याँ तो बड़ा स्वादिष्ट समझी जाती हैं। सेमाओं में 'पलोल्स' नामक कृमि की फसल खाने के लिये तैयार की जाती है। अणडा तो हर प्रकार का ही एक अच्छा भोज्य पदार्थ समझा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के वेलिज्यन काँगों प्रदेश के रहने वाले अर्धसभ्य मंगवतू लोग भुनी हुई दीमक खाते हैं। उनके यहाँ फेरी वालों के पास दो मक की बोरियाँ भरी रहती हैं।

पालक-पिता

कुटुम्ब का पालन-पोषण सर्वत्र माता का कर्तव्य समझा जाता है। पर बहुत से नर जानवर एक कुटुम्ब के पोषण करने ही में कंवल सहायता नहीं करते वल्कि उसकी सारी देख-भाल का बोझा भी उन्हीं के सिर पर पड़ जाता है। कुछ साधारण समुद्री कृमि, जिनकी पथरीली नलियाँ उनके घोंघों को ढके रहती हैं, पालक-पिता होते हैं। इनकी एक साधारण जाति जो मछली के शिकार में चारे का काम देती है, न केवल अण्डों को सेती है

बल्कि अण्डे देने के पश्चात् माता को खा जाती है—ताकि वह स्वयं अण्डों को न खा जाये ।

अनेक साधारण मत्स्य पालक-पिता होते हैं । एक छोटी-सी मत्स्य जिसकी पीठ पर काँटे होते हैं, इसका एक अतिश्वास उदाहरण है । यह सर्वत्र पायी जाती है । बसन्त ऋतु में नर का सीना लाल और चमकीला हो जाता है, इस कारण सादाएँ उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं । इन्हें वह खर-पतवार के अपने बनाये हुये गोलाकार घोंसले में लिवा जाता है और यद्योंही घोंसले में अण्डे रख दिये जाते हैं त्योंही वह उनकी रक्षा करने लगता है । वह इन अण्डों को अपने परों से हवा दे-देकर सेता है और इस प्रकार उन पर लगातार ताजे पानी की धार पहुँचाता रहता है । वह बलपूर्वक घुसने वाले समस्त मेहमानों भगाता रहता है, दिशेष कर स्वजातिभक्ती माताओं को । और अण्डों से निकलने वाले बच्चों की रक्षा उनके निकल आने के कुछ सप्ताह बाद तक करता रहता है, यहाँ तक कि वह अपने परिश्रम से पूर्णतया थककर अन्त में मर जाता है ।

१४०००० अण्डों की रक्षा—

यदि किसी को देखने की इच्छा हो तो वह समुद्र के किनारे जाकर 'बुलहेड्स', खारदार, पर बाली और अन्य मछलियों को, उक्त प्रकार अण्डों की रक्षा करते हुए देख सकता है । तितली-सा खारदार मत्स्य अण्डों को समेट कर एक घोंबे के भोतर ले जाता है और उन्हें भीतर रखकर स्वयं मुहाने के सामने आकर अपना सिर अड़ा देता है और मांग को बन्द कर देता है । सुरमई रंग की भद्दी खारदार मछली का नर १४०००० अण्डों की रक्षा करता है, जो एक चट्टान के नीचे चिपके रहते हैं । मछली के कड़े और मुर्गाबी आदि, अनेक शत्रुओं को उसे भगाना पड़ता है । इस कड़ी परीक्षा के पश्चात् नर अधिक काल तक नहीं बच-

‘पाता। नर समुद्री-घोड़ा और नली वाली मछली दोनों ही अपने-अपने निचले भांगों में लगे हुए विशेष भोलदार थैलों में अंडों का “पोषण” करते हैं। नली वाली मछली की पूँछ में ऐसी तहें होती हैं जिन्हें अंडों का स्टोर कहना उपयुक्त होगा। इस जाति में मत्स्य ही, यानी पिता ही अंडों की रक्षा करता है। इनके थैले रक्त-पात्रों से संयुक्त होते हैं, अतः वे नाभिनाल के रक्त-पात्रों के जाल की नकल-सी मालूम देते हैं। नाभिनाल भ्रूण का पालन करता है, चाहे वह भ्रूण गाय का हो, कुत्ते का हो और चाहे मनुष्य का हो।

नर मेंढक निपुण दाइयाँ होते हैं—

बहुत से नर मेंढक निपुण दाइयाँ होते हैं। उषण देशों की अनेक जातियाँ अंडों को निगल जाती हैं और अपने शरीर के थैलों में उन्हें लेकर यात्रा करती हैं। यूरोप के कुछ नर मेंढक अंडों को अपनी टाँगों में लपेट लेते हैं, क्योंकि जिस समय अंडे उत्पन्न होते हैं उस समय वे एक डोरी में बँधे रहते हैं या लड़ी की तरह आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार नर मेंढक उन्हें कई सप्ताह तक लिये-लिये फिरते हैं। दिन में वे छिपे रहते हैं और रात को चुपके से निकाल कर अंडों को ओस में तर करते हैं और जब उनमें से बच्चे निकलने वाले होते हैं तब उन्हें किसी पास ही के तालाब में रख देते हैं।

समुद्री मकड़ा नामक थलचर चट्टानों के आस-पास एक गठरी में अपने अंडे बाँध कर धूमता रहता है। शुतुर्मुर्ग परिवार के प्रत्येक सदस्य की यह एक विशेषता होती है कि वह पालक-पिता होता है। वह अपना भद्दा घोंसला बनाता है और महीने भर तक या उससे अधिक अंडों के ऊपर बैठा हुआ उन्हें सेता रहता है।

शुतुमुर्गी उस जाति के पक्षियों में से है जिसमें पिता पर दार्द का दायित्व रहता है। तीस-तीस अँडे यह अकेले सेता है। इसकी तरकीब भी खून मज्जे की रहती है। यह बड़े-बड़े अंडों को गर्म बालू में ढक कर रख देता है। सूरज की धूप उसका कार्य शोषणता से कर डालती है। “पैंगवुइन” पक्षी में नरों के कर्तव्य इतने कठोर नहीं होते, यद्यपि वे भी अपने हिस्से का कार्य कर देते हैं। पैंगवुइन पक्षी एक समुद्री चिड़िया होती है जो उत्तरी प्रदेशों में पाइ जाती है। उसके पर पंखेदार होते हैं जिनकी सहायता से वह पानी के नीचे तैर सकती है। “पैंगवुइन” मादा को जब भोजन या आराम की आवश्यकता होती है तब वह ज़ोर से अपने साथी को बुलाती है और परिवार की देख-भाल का भार उसे सौंप देती है।

‘मारमोफेट’ एक प्रकार का बन्दर होता है जो अमेरिका के गरम हिस्सों में पाया जाता है और उसकी पूँछ गुच्छेदार होती है। स्तनपायियों में “मारमोफैट” ही एक हूँडेसा नर होता है जो आतक पिता का काम करता है। केवल उस समय को छोड़कर जब माता उसे भोजन कराती है वज्ञा पूर्णतया नर ही की रक्षा में रहता है। वह बच्चे को लिये-लिये फिरता है; पहले अपने कूले पर और कुछ दिन बाद अपनी पीठ पर। पिता की देख-भाल में उस समय तक फिराई नहीं आती जब तक कि बच्चे का बोझ इतना भारी नहीं हो जाता कि उसे लेकर चलना असम्भव हो जाये।

दीर्घाकार सर्प और कृमि

वहूधा साँपों की लम्बाई बढ़ाकर कही जाती है किन्तु कहानियों की लम्बाई से सत्य बात कुछ और भी विदित होती है।

सबसे लम्बा साँप जो आज तक ज्ञात हुआ है वह पनिअा बोआ जाति का या एनेकोएडा है। जो प्राचीनकाल में मिलता था और इसको लम्बाई अट्टावन फुट थी।

बोआ एक बर्यौर ज़हरीला साँप होता है जो शिकार को दबा कर मार डालता है अर्थात् एक प्रकार का अजगर है। एनेकोएडा भी एक प्रकार का अजदहा है जो पहले लंका में पाया जाता था और अब दक्षिणी अमेरिका में मिलता है।

अफ्रीका के अजगर—

सबसे लम्बे जीवित साँप अफ्रीका के 'पाइथन' और ब्राज़िल के 'एनेकोएडा' होते हैं। इन दोनों की अधिक से अधिक लम्बाई तीस फुट की होती है। इससे बड़े उदाहरणों को किसी की गपेड़ेवाजी समझना चाहिये। इसी तरह उन कहानियों को भी समझना चाहिये जिनमें कहा जाता है कि अजगरों ने घोड़ों और भैंसों को मार डाला और उन्हें निगल गए। वे इतने बलवान अवश्य होते हैं कि बड़े-बड़े स्तनपायियों को मार डालें, किन्तु उनके मुँह इतने चौड़े नहीं होते कि उन्हें निगल जायें।

बड़े से बड़े समुद्री साँप, जो उष्ण समुद्रों में पाये गये हैं, छैं या आठ फुट से अधिक लम्बे नहीं होते।

जीवित ढोरी—

जब कुछ जीवित कीड़ों की लम्बाई से उन साँपों की लम्बाई की तुलना भी जाती है तो उनकी लम्बाई विलक्षण तुच्छ मालूम देती है। सबसे लम्बे फीते की शक्ति के कृसि या केंचुए जो मनुष्य के शरीर से निकाल कर नापे गए, हैं, ८० फुट से ऊपर तक के देखे गये हैं। इनसे भी अधिक लम्बे जूते के फीते की

तदह के कृमि होते हैं । ये अक्सर समुद्र के किनारे चट्टानों के नीचे मिलते हैं । पहले देखने में यह कृमि बछड़े के जिगर का-सा ढेर मालूम देता है किन्तु छड़ी से छूने पर वह धीमे-धीमे किल-बिलाने लगता है और मट्टर चाल का एक कीड़ा दिखलाई देने लगता है । तब उसकी लम्बाई ; असीम मालूम देती है । यह ९० कुट तक का देखा गया है । इसके एक सिरे पर प्याली के आकार का मुँह होता है ।

केवल आस्ट्रोलिया में पाया जाता है—

संसार का सबसे लम्बा केचुआ १२ कुट का होता है और वह आस्ट्रोलिया के उर्वर दक्षिणी सूबे में पाया जाता है । यह कृमि लगभग एक इच्छ मोटा होता है और सहज ही में टूट जाता है । वह बहुत गहराई तक खोदता चला जाता है और वहाँ करोब तीन इच्छ लम्बे, कड़े और सींगदार अंडे देता है । यह कृमि बहुधा हँसने वाले 'जैकास' का शिकार होता है । 'जैकास' छोटे-छोटे कोड़ों पर निर्वाह करता है । यह किलकिला अर्थात् राम-चिरइया जाति का एक पक्षी होता है और तूती परिवार का एक सदस्य है । शिकारी पक्षियों का इसका माँस अस्कादिष्ट मालूम होता है इसलिये यह बचा रहता है । यह एक लम्बा और थका देने वालों रसाकशा के पश्चात् इस ८ या १० कुट लम्बे भोजन को सुख से चट कर जाता है ।

योनि-परिवर्तन

सनुष्यों के विवित यानि-परिवर्तन कभी-कभी समाचार पत्रों में देखने में आते हैं । किन्तु जा बात हमें विवित-सी मालूम

देती है वह अनेक निम्नकोटि के जीवों में एक बिल्कुल साधारण घटना होती है।

वार्षिक योनि-परिवर्तन

कस्तूरा मछली अपना जीवन नर के रूप में आरम्भ करती है, फिर बदल कर मादा हो जाती है। वह अपने जीवन भर प्रति वर्ष योनि-परिवर्तन करती रहती है। इन्हिस्तान में 'स्लिपर लिम्पेट' नामक एक छोटा-सा घोंघा होता है जो चट्ठानों से चिपका रहता है। यह सिप्पी नर से बदल कर ड्रिंग अर्थात् एक ऐसा प्राणी बन जाता है जिसमें छी और पुरुष दोनों के लक्षण होते हैं। और फिर उक्त प्राणी से बदल कर मादा हो जाता है। इस प्रकार उसकी संख्या बड़े बेग से बढ़ती जाती है और वह सिप्पी की मछली का गला घोंट देता है।

हौजों में पाली जाने वाली मछलियों में मेक्सिको की तल-वार की-सी दुम वाली छोटी मछली बड़ी लोकप्रिय होती है। साधारणतया इनकी आबादी में मादाओं की संख्या अधिक होती है, और मालूम ऐसा देता है कि जन-संख्या की बराबरी करने ही के अभिप्राय से वे कई बार अंडे देने के पश्चात् क्रियात्मक नरों में परिवर्तित हो जाती हैं।

प्राचीन समय में इस योनि-परिवर्तन के सम्बन्ध में लोगों की विचित्र धारणाएँ थीं। फिर भी ऐसी अजूबा चिड़ियाँ देखी गई थीं। हाल में मुरियों के ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जो उत्तेजक (कुड़क) हो गई हैं और मुर्गों की तरह बाँग देने लगी हैं। इसके विपरीत अनेक मुर्गे अंडे देते हुये और उन्हें सेते हुए देखे गये हैं। जननेन्द्रियों का एक रोग-विशेष ही इन बातों का जिम्मेदार होता है।

दवाओं में जानवर

बहुधा पाठकों ने देखा होगा कि जंगली जड़ी-बूटी बेचने वाले बनजारे अपनी दुकानों पर ऊसड-साँडे भी रखते हैं। इससे पता चलता है कि दवाओं में जानवरों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मध्यकाल से चूहे, छछूँदर, मेंढक, घोंघे आदि अनेक जानवरों से कई प्रकार की दवाएँ तैयार करके प्रयोग की जाती थीं। अभी ५०-६० वर्ष हुये तब तक काले साँप की चर्बी कई रोगों में डाक्टरों द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी और आज भी कहीं-कहीं घोंघे की गोली मिट्टी मस्सों के इलाज में प्रयोग की जाती है।

बन्दर की ग्रन्थियाँ मनुष्य में पुरुषत्व लाने के लिये प्रयोग की जाती हैं। चेचक का टीका लगाने के लिये जो दवा इस्तेमाल की जाती है वह भी जानवरों ही से, बिना उन्हें हानि पहुँचाये हुये प्राप्त की जाती है। साँप का विष खून बन्द करने में और मिर्गी आदि रोगों में प्रयोग किया जाता है। कई रोगों में काढ़ मछली का तेल तो रामबाण औषधि समझा जाता है। शरीर के किसी भाग से खून निकालने के लिये जोंकों का प्रयोग तो बहुत पुराना है और आज भी उसका प्रयोग होता है, विशेष कर कान और आँख के पास का खून निकालने के लिये। ऊदबिलाव के तेल से 'कैसटोरियन' नामक दवा तैयार की जाती है जो औषधि के अतिरिक्त सुगन्ध का भी काम देती है। झोंगुर का गाढ़ा तेल छाला डालने के काम में प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी हिरन की नाभि से प्राप्त की हुई कही जाती है। अम्बर दो-शाखा मछली की कड़ी चोंच से तैयार की जाती है और तैलीय हेल की आँतों में भी मिलती है, जो इन दो-शाखा घोंघों को खाती है।

विषैले जीव

विष एक मात्रा की बात है। एक बच्चे की मुँह की लार से विभिन्न छोटे-छोटे जानवरों की उस समय मृत्यु होते देखी गई है जब वह लार उनके रक्त प्रवाह में प्रवेश करा दी जाती है। जिन जानवरों के शरीर में विष प्रयोग करने के लिये पाया जाता है उनकी संख्या बहुत बड़ी नहीं है और जो है भी उनके विषों के गुणों में भी बड़ा अन्तर होता है।

हजारों आदमी प्रति वर्ष साँप काटने से मरते हैं—

आस्ट्रेलिया का 'डकमोल' ही एक ऐसा स्तनपायी है जिसमें विष होता है। उसके नर की प्रत्येक पिछली टाँग के भीतर की ओर एक तेज़ और झुका हुआ काँटा होता है। ये काँटे पोले होते हैं और उनका सम्बन्ध विषैली ग्रन्थियों से होता है। उनके लगने से मनुष्य के शरीर में बड़ी भयंकर पीड़ा होती है किन्तु कोई मृत्यु होती हुई नहीं देखी गई है। सर्पों की जीवित जातियों में से लगभग एक तिहाई के विषैले होते हैं, जिनके विष का अन्तर एक वर्ष के काटने से लेकर कुछ जणों में मनुष्य की मृत्यु उत्पन्न कर देने तक होता है। भारतवर्ष में प्रति वर्ष लगभग ४०००० मौतें साँपों के काटने से होती हैं, अफ्रीका में सौ-पचास और अमेरिका में मुश्किल से एक-आध ! सर्प का विष लार को परिवृद्धि ही है और वह दो बड़ी-बड़ी ग्रन्थियों में रहता है जो सिर के दोनों ओर एक-एक होती हैं। जब साँप काटता है तो यह विष एक पोले दाँत के द्वारा उस स्थान पर पहुँचा दिया जाता है।

महा विषैले सर्प—

अत्यन्त प्राणनाशक सर्प अफ्रीका के 'मस्वास' और 'पक' नामक जहरी साँप, हिन्दोस्तान का कांत्रा, मलाया देश का राज

कोब्रा और अमरीका के मँगो के सदृश साँप होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के थूरने वाले कोब्रा में एक विचित्रता होती है कि वह अपने शिकार पर विष की दो धाराएँ पिचकारी की तरह छोड़ता है। आँखों पर इन पिचकारियों के पड़ने से लण्ठिक अन्तरापन आ जाता है और यदि किसी खराब या छोटे-मोटे घाव में यह विष प्रवेश कर जाता है तो मृत्यु हो जाती है। साधारण में डंक अपने अधिमाँस या मस्सों से जो उसके सारे शरीर पर होते हैं एक विषैला पदार्थ निकालता है। इसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पर चैसा ही होता है जैसा कि बड़े जोर की जूँड़ी आने पर होता है। कोलम्बिया का बृक्ष पर रहने वाला एक मेंडक ऐसा मारक विष पसीने के रूप में उत्पन्न करता है कि वहाँ के आदिम निवासी अपने तीरों की नोंकों में उसे लगाते हैं।

अनेक मछलियों (जैसे कि टायगरफिश और ग्रिंगरेज) के काँटों में जहर होता है। इन्हिस्तान के आस-पास के समुद्रों में मछलियों की दो जातियाँ पाई जाती हैं जिन्हें नश्तरी मछली कहते हैं। इनकी पोठ पर अत्यन्त तेज़ काँटे होते हैं और इनसे जो घाव होते हैं वे बहुधा पक जाते हैं। इनके पिछले परों और काँटों का सम्बन्ध साँपों की तरह विषैली प्रनिधियों से होता है। इनके विष को दूर करने के लिये 'परमेगेनेट पोटाश' (लाल दवा) बड़ी लाभदायक होती है। जो धोंधे विषैले समझे जाते हैं वे ग्रायः उष्ण समुद्रों में मिलते हैं और देखने में बड़े सुन्दर होते हैं। इन्हें कोकल कहते हैं। इन कोकलों की सिपियों में रहने वाले जीवों के विषैली प्रनिधियाँ और पोले दाँत होते हैं। यह बड़े जोर से काट कर घाव कर देते हैं।

समस्त खन्खजूरों, विच्छुओं और मकड़ियों के जहरीली अनिधियाँ और नोकदार दाँत होते हैं। विच्छु को प्रनिधियाँ उसको

पूँछ के सिरे पर होती हैं। सबसे ज़हरीली मकड़ी अमरीका की “काली राँड” होती है। इसका यह नाम इसके काले रंग और नारी स्वभाव के कारण पड़ा है जो प्रायः अनेक मकड़ियों में होता है कि वह अंडों के फलित होने के पश्चात् अपने पति को खा जाती है। काली राँड के काटने से अक्सर मृत्यु नहीं होती।

मकड़ी मकड़े से प्रेम करती है, मगर प्रेम करने के साथ ही साथ उधर गर्भ धारणा होती रहती है इधर मकड़ी मकड़े को खाती जाती है। इङ्ग्लिश चैनेल के किनारे एक कीड़ा इस क्रिस्म का मिलता है कि नर और मादा दोनों के बीच में बालू की एक ही नली हांती है, जिसमें मादा अंडे रखती है। नर उस नली पर अपने शरीर की लेय-मय गति से थोड़ा-थोड़ा पानी बहाता है, ताकि वे जल्दी से सिंक जाये। मगर मादा अंडे देने के बाद अत्यन्त अशक्त हो जाती है। उसके लिए नये कीड़े को जन्म देना मरण के समान है। नर इस मादा को इतना दुर्बल देखकर गम्भीरता पूर्वक चटकर जाता है। बेचारी कीड़ों को माता के लिए तो वह जल-दान मरण है परन्तु पिता के लिये वह सुन्दर भोजन बन जाता है।

पूँछ आदमी की और दूसरों की

यह बहुधा सुना जाता है कि मनुष्य ने अपनी पूँछ बैठ-बैठ कर विस डाली है। यह बात सत्य नहीं है। बहुत से बन्दर और दूसरे जानवर—जैसे मारमोट नामक गिलहरी और ऊदबिलाव अपनी पूँछ के ऊपर बैठने में बहुत-सा समय ख़र्च करते हैं किन्तु तो भी उनकी अत्यन्त सक्रिय पूँछें बनी हुई हैं।

पूँछ आदमी की और दूसरों की]

कम होकर कुछ छोटी हड्डियाँ रह गई हैं—

धरती पर निरन्तर सीधे चलने के कारण मनुष्य की पूँछ कम होकर छोटी हड्डियों के रूप में रह गई है। सीधे चलने में उसे पूँछ की सहायता लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः उसके लिये वह बेकार है। परन्तु यदि वह फिर वृक्षों पर रहने लगे और शाखाओं पर दौड़-धूप करने में अधिक समय व्यतीत करे तो उसे पूँछ के स्थान में किसी जाड़े की वस्तु की जरूर आवश्यकता होगी।

एण्डमान, फिलीपाइन्स और अन्य उष्ण टापुओं में कुछ जंगली जातियाँ हैं जो अपना कुछ समय वृक्षों की पतली डालियों पर चलने-फिरने में व्यतीत करते हैं। ये लोग वैसे ही एक मीजान बराबर करने वाले लम्बे बाँस का प्रयोग करते रहते हैं, जैसा कि सरकस वाले करते हैं। चूहा, गिलहरी या दूसरे वृक्ष वाले जीव इसी प्रकार अपनी पूँछ का प्रयोग करते हैं, जिस ओर बोझ बराबर करने की आवश्यकता होती है उसी ओर पूँछ को दाहिनी या बाईं ओर धुमा देते हैं।

पूँछ हाथ और लंगर का काम देती है—

मेरुदण्डीय प्राणियों में पूँछ रीड़ का एक टुकड़ा है जो उस धुँधले भूतकाल की बची हुई निशानी है, जब कि प्रथम मछली समुद्र से रेंग कर किनारे पर जा लगी थी और उसने चलने योग्य अंगों की परिवृद्धि की थी। पूँछ अनन्त कामों में लाई जाती है, और बहुधा भिन्न-भिन्न जीव जो घटनावश एक ही समान जीवन व्यतीत करते हैं, पूँछ को भी एक ही तरह से प्रयोग करते हैं। मकड़ी, बन्दर, वृक्ष-साही, हिमालय की रीछ-बिल्ही, ब्रेज़िल का शरद-भालू, गिरगिट, छिपकली और समुद्री-

घोड़े के नाम से प्रख्यात मत्स्य पूँछ को उस वस्तु के परुड़ने में हाथ की तरह प्रयोग करते हैं जिसे वे लंगर के समान इस्तेमाल करना चाहते हैं।

गिरगिटात अपने शरीर की लम्बाई से भी अधिक दूर तक अपनी जीभ निशाल सकता है, यदि वह अपनी पूँछ के सहारे से अपने को किसी शाखा में अटका न ले, तो उपर्युक्त प्रयत्न में वह सिर के बल गिर पड़ेगा।

शेर वे विलियाँ हैं जिन्होंने पेड़ों पर चढ़ना छोड़ दिया है, किन्तु उनकी पूँछ मक्खी उड़ाने वाले चैवर के काम के लिये बनी हुई है, और यही काम वह हाथी, घोड़े, बैल, और इन्हों के समान खुर वाले जानवरों में करती है। थोड़े से जानवर पूँछ से एक बैठक की चीज का काम लेते हैं। कॅगारू और बड़े-बड़े बालों वाले बन्दर अपनी पूँछों का सूटिङ्ग सूल की तरह प्रयोग करते हैं। कठफोड़ना और परतदार चींटी-खोरे किसी खड़ेबज्जे पेड़ के धड़ को ढङ्कता से पकड़ कर अपनी कड़ी पूँछों पर वैसे ही बैठ जाते हैं जैसे कि तार के खम्भे की मरम्मत करने वाला आदमी अपनी रक्षा करने वाली पेटी के सहारे से पीछे लटक जाता है।

कुछ मछलियाँ, जैसे कि मलाया की कीचड़ में कूदने वाली और हिन्दुस्तान की चढ़ने वाली प्रिच नामक मछलियाँ अपनो पूँछों को जमीन पर अपने को आगे बढ़ाने के लिये इस्तेमाल करती हैं, वे उसे नाव की लग्नी की तरह प्रयोग करती हैं। उनकी पूँछ उन्हें ऊपर चढ़ाने में भी सहायक होती है। एक बड़ी गुच्छेदार पूँछ, जैसी कि चींटी-खोरे और गिलहरी की होती है, रात को ढकने वाली तोशक का भी काम देती है। यदि पूँछ वैसी हो जान्नवृत हो जैसी कि अफ़्रीका की चींटी-रीछ की, और उसी तरह

गाँठों और काँठों से सुसज्जित हो जैसी कि अनेक ~~छिपकलियाँ~~
की, तो वह एक बड़ा प्रभावशाली अस्त्र भी हो जाती है।

खतरे की घंटी के रूप में पूँछ—

खतरे की घंटी के रूप में पूँछ के प्रयोग किये जाने के दो तरीके हैं। एक जाना-माना उदाहरण खरगोश की “खटखट” है। यह हिरन की छोटी पूँछ की तरह, जिसके दोनों ओर प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले चिन्ह होते हैं, पीछे वालों के लिये मार्ग प्रदर्शन करती है और जिस ओर छिपने के लिए जानवर भागता है उस मार्ग की ओर संकेत करती है।

ऊद्दबिलाव की पूँछ एक चौड़ी पत्ती की तरह बनी होती है और आठ इच्छ्र लम्बी तथा आध इच्छ्र मोटी होती है। तैरने के लिये यह एक प्रभावशाली अंग होती है और जब कोई खतरा आने वाला होता है तब उसे पानी पर ऐसे मारा जाता है कि एक बड़े जौर की आवाज उत्पन्न होती है। यही एक ऐसी पूँछ है जो खतरे की घंटी वाली बन्दूक के रूप में इत्तेमाल की जाती है।

पूँछ का प्रथम प्रयोग मछली ने किया था और प्रारम्भिक दशा में वह एक आगे ढकेलने वाले अंग के रूप में काम में आती थी। उसमें साधारणतया पर्याप्त चर्बी एकत्रित रहती है। मरुभूमि के कुछ चूहे और छिपकलियाँ अपनो पूँछ को चर्बी के एक गोदाम के रूप में प्रयोग करते हैं। दुष्काल के समय के अन्तरशः अपनी पूँछों पर वैसे ही निर्वाह करते हैं जैसे कि ऊँट अपने कोहान पर निर्वाह करता है।

विलक्षण दैत्याकार प्राणी

विकृति और विलक्षण जीव जिन्हें वैज्ञानिक प्राणि-शास्त्र के असंगत कार्य कहते हैं, अक्सर देखने में आ जाते हैं। इन असाधारण जीवों की प्रथम परिवृद्धि का प्रारम्भ अण्डे हो से होता है, ये अण्डे चाहे मनुष्यों के हों और चाहे कोड़े-मकोड़ों के। जब अण्डा पहले-पहल बनता है, तब वह कुछ समय तक एक अकेली समग्रता का व्यवहार करता है। जिस पदार्थ का वह बना होता है उसका बँटवारा व्यापक होता है। किन्तु थोड़े दिनों के पश्चात् सिर, अंग, हृदय आदि बनने लगते हैं अर्थात् उसके कोषीय विभागों का कार्य आरम्भ हो जाता है, और वह क्रोटेछोटे कोषों में विभाजित और उप-विभाजित होने लगता है, और अन्त में ये कोष अपने को समूहों के रूप में प्रकट करते हैं, जिनमें से प्रत्येक समूह एक विशेष कार्य करता है। किन्तु यदि प्रारम्भिक अवस्थाओं में कोई घटना हो जाती है तो परिणाम स्वरूप अद्भुत प्राणी का जन्म होता है। जितनी ही निम्नकोटि का जीव होगा उतनी ही अधिक सम्भावना होगी कि ऐसा अद्भुत प्राणी जीवित रह सके। आजकल के वैज्ञानिक युग में यह सम्भव है कि विज्ञान की प्रयोगशाला में अंडे के कोषीय विभाजन के प्रारम्भिक काल में उसकी “डाक्टरी” करके दो सिरवाजे मेंटक, एक आँख और दो पूँछ वाली मछली आदि बनाई जा सकें। जितनी उष्मकोटि का जीव होगा उतनी ही कम सम्भावना इस बात की होगी कि अजूना जीव उन उपकरणों से बच कर सुरक्षित निकल सके जिसमें कि उसका यंत्र चालू हो गया है।

दो सिर का सर्प—

कुछ वर्ष हुए न्यूयार्क नगर के चिड़ियाघर में दो सिर वाला

साँप था। प्रत्येक सिर की गर्दन प्रथक थी और कई इच्छ लम्बी थी। वह पूरी अवस्था का था और लगभग दो फुट लम्बा था। उसके जीवित बच जाने पर बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि उससे अनिच्छित आत्म-हत्या का भय रहता था। खाने के समय दोनों सिर अलग-अलग खिलाये जाते थे, नहीं तो वे उस मुख्य आहार नली का अवरोध कर देते जहाँ पर कि दोनों प्रथक आहार-नलियाँ मिलती थीं। उन दोनों के बीच में एक दफती लगा दी जाती थी ताकि वे लड़े नहीं। किन्तु पहले से सचेत रहने के सारे प्रयत्नों के होते हुए भी अन्त में एक सिर ने दूसरे पर आक्रमण किया और उसे खा गया।

बायाँवर्ती झींगा—

कभी-कभी घोंघों में एक विचित्र अजूबापन देखा जाता है। कोई विशेष बात, जो आज तक पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकी है, अरण्डे में ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर देता है कि सिधो बजाय दाहिनी तरफ मुड़ने के बाईं ओर मुड़ जाती है। संप्रह करने वाले लोग ऐसे उलटे चक्कर के शंखों और सिधियों को बड़े चाव से ढूँढ़ा करते हैं। १०००० झींगों में से एक दाहिने के बजाय बाईं ओर को मुड़ता है। बायाँवर्ती झींगा बहुत हो कम मिलता है और सम्भवतः इसीलिये वह संसार के अमूल्य घोंघों में से समझा जाता है।

पतिंगों और तितलियों में आकस्मिक घटना से ऐसे विचित्र अजूबे उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें 'जिनैडर' कहते हैं। यह योनि की एक पिछीकारी या जरवक्वी है और विरोधों कोषम् अवस्थाओं से उत्पन्न हो जानी है। प्रायः कोष्ठ के सन्दूक या पात्र के नीचे की ओर गिर जाने से ऐसा होता है। जीवों में कुछ ही जातियाँ ऐसी हैं जो इस प्रकार के व्यवहार का प्रत्युत्तर देती हैं। जब पूर्ण

कीड़ा निकलता है, तब उसके पंखों में नर और मादा दोनों नमूने की विचित्र मिलावट दिखलाई पड़ती है। दोनों की चिप्पड़े परस्पर ऐसी मिश्रित होती हैं मात्र वह एक पुराने कैशन की ऊल-जलूल रजाई है।

एक विशेष प्रकार का दूसरा अजूबा केवल कुछ गायों में उत्पन्न होता है। कभी-कभी ऐसे बछड़े उत्पन्न होते हैं जिनका मुँह बुलडाग कुत्तों के पिल्लों से मिलता है, ऐसे अद्भुत प्राणी प्रायः जन्म लेते ही समाप्त हो जाते हैं।

जन्तु-जगत के बौने

सबसे छोटी स्तनपायी एशिया की नाटी छछूँदर है। अफ्रीका के जवान हाथी की ऊँचाई के सामने बिना पैछ को उक्त छछूँदर का आकार हाथी का १४४वाँ भाग होता है। हाथी की अपेक्षा छछूँदर के शत्रु अधिक होते हैं। यदि छछूँदर ५० या १०० फुट की ऊँचाई से गिर पड़े तो उसे सिवा एक थोड़ा सा झटका लग जाने के और कोई हानि नहीं होगी, किन्तु यदि इतनी ही ऊँचाई से हाथी गिरेगा तो वह बिलकुल मर ही जायेगा।

मधुमक्खी के घरावर चिड़िया—

सबसे छोटी जीवित चिड़िया “इक्वेडर” की गुनगुनाहट पैदा करने वाले चिड़ियों की एक जाति है। यदि उसके पंख उखाड़ डाले जायें तो वह रानी मधु-मक्खी से बड़ी न रह जायेगी और तौल में भी रानी मधु-मक्खी के बराबर ही

होगी । अतः यही कारण है कि वह उड़ने में बड़ी शक्तिशालिनी होती है ।

इक्वेंडर का सबसे छोटा मेंढक यदि वह अपने हाथ पैर समेट ले तो रानी मधु-मक्खी से भी छोटा होता है । वह संसार की छोटी से छोटी मछली के सामने बौना मालूम होता है । संसार की सबसे छोटी मछली फिलीपाइन टापू की झोलों में पाई जाती है, जिसकी नाक से लेकर पूँछ के परों तक की लम्बाई आध इच्छ होती है ।

संसार का सबसे छोटा कीड़ा—

कीड़े-मकोड़े छोटे होते ही हैं । उनके छोटेपन ने उन्हें सारी पृथकी पर बसने में सहायता की है, क्योंकि वे बड़े चंचल होते हैं । किन्तु उनके छोटेपन ने उनके लिये अन्य प्रकार से रुकावट भी उत्तर दी है । एक बीड़ा साधारण प्रकार से पानी नहीं पी सकता । यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो परिणाम यह होता है कि वह पानी में फँस जाता है और वहीं क़ेद हो जाता है । अध्यापक जे० बी० एस० हाल्डेन ने कहा है कि “पानी पीने वाले कीड़े के लिए उतना ही बड़ा भय रहता है जितना कि उस आदमी के लिये होता है जो चट्टान की खड़ी दोवाल पर से अपने भोजन के लिए नीचे भाँकता है ।”

संसार का लघुत्तम कीड़ा एक मक्खी होती है जिसे ‘एत्ताफिस’ कहते हैं । दोनों पंख फैलाने पर उसकी नाप पनीर के घुन के शरीर से भी छोटी है । पनीर के घुन की तुलना में एक पिस्सू बड़ा भारी जीव होता है । अर्थात् उसके बड़े होने का अनुपात वही होता है जो एक हाथी का छछूँदर के प्रति होता है । तो भी ८०००० पिस्सू तौल में केवल आधी छटाँक होते हैं ।

अनुवीक्षण यंत्र से भी अदृश्य—

जीवधारियों में अधिकांश छोटे ही होते हैं और समुद्रों की सारी आबादी के ९९ प्रतिशत बौने ही होते हैं। पहिया-प्राणी जो अति सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्म दर्शक यंत्र ही से दिखलाई पड़ते हैं, खारी और मीठे दोनों प्रकार के जलों में अधिकता से पाये जाते हैं। इनमें का सबसे छड़ा प्राणी १० मिलीग्राम से कम होता है और सबसे छोटा एक प्राम के १ बटा १००००००० वें भाग से भी कम। ऐसा एक पहिया-प्राणी पेचिश उत्पन्न करने वाले एक-कोषीय कीटाणु से दस गुना बड़ा होता है।

इस मापदण्ड से नीचे अगणित जीवित प्राणी होते हैं, जिनका ठीक-ठीक सभीकरण बहुधा संदेहात्मक रहता है। वैज्ञानिकों को उन्हें निश्चयात्मक रूप से प्राणियों और वनस्पति में श्रेणीवद्ध करने में संकोच होता है। ऐसी जीवित वस्तुएँ कीट या कूमि होते हैं। मुँहखुरा-रोग उत्पन्न करने वाले कीट की तरह अनेक कूमि इतने छोटे होते हैं कि वे बड़ी से बड़ी ताक़त वाले अनुवीक्षण यंत्र से भी अदृश्य ही रहते हैं और महीन से महीन छन्ने को भी पार कर जाते हैं। किन्तु उनका अस्तित्व होता है, यह अति स्पष्ट है।

फेफड़े और बिना फेफड़े

लाडे नुफील्ड ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक अस्पताल को लोहे का एक फेफड़ा भेंट किया था। यह फेफड़ा उन लोगों को जीवित रख सकता है जिनके फेफड़े स्वयं काम नहीं कर सकते। इस लोहे के फेफड़े को देख कर अनेक लोगों ने यह अनुभव किया है कि साँस लेना वैसा सरल काम नहीं है जैसा कि वह

प्रत्यक्ष में मालूम देता है। साँस लेना बास्तव में जलाना है— प्राणवायु को जलाना। इस जलाने की क्रिया को सम्भव बनाने में भोजन ईंधन का काम करता है।

हम फेफड़े के भीतर हवा को खींच कर ले जाते हैं, इसको रक्त-बाहिनी ग्रहण कर लेती हैं। फेफड़े अधिकतर इन्हीं रक्तपात्रों या रक्तवाहिनियों से बने हुए होते हैं। हृदय के द्वारा हवा सारे शरीर में धूमने के लिये भेज दी जाती है और “सुस्त”—अर्थात् विषेजी गैस और नमी जो फेफड़ों में लौट कर आती है पुनः निकाल कर नाक के द्वारा बाहर हवा में फेंक दी जाती है, और नाक ही के द्वारा तुरन्त ताजी हवा भीतर आ जाती है। मोटे तौर पर यही ढंग हमारे और समस्त स्तनपायियों के साँस लेने का होता है।

मुँह और गला धौंकनी के रूप में—

पक्षियों में हवा के थैले होते हैं, ये थैले फेफड़ों में लगे रहते हैं। ये अपने में ओषजन को ग्रहण करते हैं, और उसे सारे शरीर ही में नहीं पहुँचाते, किन्तु हड्डियों में भी प्रविष्ट कर देते हैं। इसी से स्तनपायियों की अपेक्षा पक्षियों में अधिक हल्कापन आ जाता है। इसी के द्वारा वे अपार शक्ति प्रदर्शित करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि एक पक्षी जब तक वह सोता नहीं मुश्किल ही से विश्राम करता है। हमारे समान ही उनके फेफड़े भी धौंकनियाँ होते हैं जिन्हें पसलियाँ और महा-प्राचीर-परदा चलाते हैं।

एक मेंढक के न तो कोई पसली होती है और न महा-प्राचीर-परदा। इसका मुँह और गला धौंकनी का काम करते हैं। एक मेंढक को जितनी हवा की आवश्यकता होती है उसे वह अपने

नथुनों के द्वारा अक्षरशः निगलता है, मुँह को बन्द रखता है, नहीं तो पम्प करके हवा बाहर निकालना असम्भव हो जाये। यही क्रिया मेंढक की हाँफती हुई सूरत का कारण होती है, जिसे लोग भूल से भय या कम्पन समझते हैं। १

अतः पशु-पक्षी, और उभचर तीन भिन्न प्रकार से साँस लेते हैं। किन्तु सब में यह समानता होती है कि साँस लेने के अबौं का तर होना आवश्यक है, नहीं तो छोटे-छोटे-रक्त-पात्र ओषजन को सोख नहीं सकते। यही कारण है कि अधिक सुखी हवा में साँस लेना बड़ा कठिन होता है और इसी से हमारी समझ में आ जाता है कि दमें से पीड़ित लोग गीली आवोहवा में क्यों बड़े प्रसन्न रहते हैं।

पूँछ के द्वारा साँस लेना—

पानी में रहने वाली मछलियाँ अपने गलफड़ों के द्वारा बड़ी सरलता से हवा को अपने भीतर ले जाती हैं। इन गलफड़ों का रंग लाल होता है क्योंकि ये अक्षरशः रक्तपात्रों का एक समूह होते हैं। बहुत-सी मछलियाँ की खाल बड़ी पतली होती है, विशेष कर पुच्छ-पृष्ठ पर। इनका यह पतला चर्म भी ओषजन प्रहरण करने में सहायक होता है। जो मछलियाँ इस प्रकार बनी होती हैं, उन्हें दूसरों की अपेक्षा लाभ रहता है और पानी से बाहर होने पर उन्हें कम कष्ट होता है।

इन्हीं के समान मेंढक और केंचुए भी अपनी त्वचा से बहुत सी ओषजन अपने अन्दर ले जाते हैं और खादार पर वाली मछली तथा उषण प्रदेश की कीचड़ में फुटकरे वाली मछली के समान पतली खाल वाली मछलियाँ की तरह वे किनारे पर भी प्रसन्न रहते हैं, किन्तु शर्त यह है कि उन्हें थोड़ी सी तरी मिलती

रहे। कुछ मछलियों के तैरने वाली खाजा-रूतो हुई थैली होती जो मुख्यतया उनके उत्तराने के काम की हातो है। वह ऐसो बनो होती है कि वह फेफड़े का काम करती है, आस्ट्रेलिया, अफ्राका और अमेरिका की फेफड़े वाली मछलियों के उदाहरण बहुत असिद्ध हैं, यद्यपि ये पानी ही में बड़े मजे से रहती हैं, किन्तु पानी से बाहर भी कई मास तक रह सकती हैं।

जमीन पर रहने वाले घोंघों में साँस लेने का एक विचित्र औजार होता है। जब किसी बगीचे का घोंघा चलता है तो उसके ऊपरी खोल का दो तिहाई स्थान एक फूजा हुआ थैला अहण कर लेता है—अर्थात् फेफड़ा। घोंघों के दाहिनी आर खोल के मुँह के पास एक छोटे-से गोल छेद के रूप में इसका ढार सखलता से देखा जा सकता है।

भिनगों के रोशनदान होते हैं—

कीड़े-मकोड़े एक दूसरे सिद्धान्त से साँस लेते हैं। किनगां के अगल-बगल रोशनदानों की तरह छोटे-छोटे छेद सब किसी ने देखे होंगे। इन छेदों से होकर इस जीव के भीतर एक मार्ग जाता है जो भ्रम में डालने वाली नलियों को एक भूल-मुज़ैया होता है और चक्र काटने वालों हवा से भरा रहता है। पक्षियों के समान कीड़े-मकोड़े भी सत्रिपातिक रूप से क्रियाशोल रहते हैं।

अनेक जानवरों के यद्यपि गलफड़े नहीं होते, फिर भी वे पानों के अन्दर रह कर साँस लेते रहते हैं। वे यह क्रिया दो अकार से करते हैं या तो वे अपने नथुनों को किसी छोटे से टोले के ऊपर करके साँस ले लेते हैं या अपनी पँड़ के सिरे से साँस लेते हैं। पानी के गुबरोजां को यह क्रिया करते हुए गर्मी के दिनों

में किसी भी तालाब पर देखा जा सकता है। बहुधा खाद के पानी के कठौते में एक आध मोटा कोआ या घुन मिल जाता है, जो स्वयं तो लगभग एक इच्छ लम्बा होता है किन्तु उसकी बाल बराबर पतली “पैँछ” उसके आकार से छै गुना लम्बी होती है। इसे मूषक-पुच्छ कीट कहते हैं जो स्थानान्तरित होकर एक मक्खा-बन जाता है। वह अपनी पोली पैँछ के द्वारा स्वच्छ वायु घसीट कर उसी गन्दगी में रहने का प्रबन्ध कर लेता है जिसे वह खाता है।

देखने वाली आँख के चमत्कार

आँखें दो काम करती हैं। वे प्रकाश और चित्रों को ग्रहण करती हैं। किसी भी प्रकार की सबसे पहिली आँखें केवल प्रकाश सुवेधी थीं; उनमें छितरे हुए प्रकाश पकड़ने वाले वैसे कोष थे जैसे कि एक-कोषीय कृमि और भिन्न-भिन्न कृमियों में होते हैं। जब जीव अधिक पेचीले बन गए तब ये कोष समूहों में इकट्ठे हो गए और अन्त में एक प्रकार के चित्र सम्भव हो सके।

यह सम्भव है कि एक घोंघे को कुछ वस्तुओं के धुँधले चित्र दिखाई दे सकते किन्तु उसी दशा में जब कि वे वस्तुये बहुत हो पास होतीं। मिनगों के समान कीड़े-मकोड़ों के कोओं के सिर के प्रत्येक ओर सात या अधिक आँखें होती हैं, और ये भी धुँधले ही चित्र देख सकते हैं। तितली के समान एक पूर्ण कोट के बहुधा कई हजार आँखें होती हैं, जो दो बड़े समूहों में क्रम से स्थिर होती हैं। जो चित्र ऐसी आँखें ग्रहण करती हैं कदाचित् बहुत कुछ उन चित्रों के सदृश्य होते हैं जो जालीदार खिड़कियों से दिखलाई देते हैं।

मनुष्यों की अपेक्षा पक्षियों की दृष्टि अच्छी होती है—

रीढ़ वाले जानवरों को आँखों में भी बड़ा वैभिन्न होता है। प्रत्येक बात आँखों की शक्ति के केन्द्र-विन्दु पर आश्रित होती है। जिस प्रकार चित्र उतारने वाले केमरे की तालें एक पैंच द्वारा घुमाई जाती हैं उसी तरह आँखों को तालों को पेशियों द्वारा आगे पीछे हटाना चाहिये। एक “काड़” मछली अपनी आँखों को केन्द्रित कर सकती है, किन्तु एक ‘श्वान’ मछली किसी वस्तु को प्रायः छूकर ही उसके पास होने का सुख उठा सकती है।

समस्त जानवरों में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे उत्तम होता है किन्तु उसकी आँखें सबसे बढ़िया नहीं होतीं। हम रंगों का आनन्द उठा सकते हैं, जब कि एक कुत्ता, ऐसा विश्वास किया जाता है, काले और सफेद संसार में रहता है। किन्तु एक पक्षी की अपेक्षा हमारी दृष्टि कम तीव्र होती है। एक पक्षी की प्रत्येक आँख में हड्डी की पत्तर का एक छल्ला होता है, इसी की सहायता से वह दृष्टि को केन्द्रित करने की अद्भुत शक्ति का आनन्द उठाता है। यह ठोक एक केमरा के महा-प्राचीर-परदे के समान कार्य करता है और आवश्कतानुसार अधिक या कम प्रकाश को आने देता है। एक उक्काब या गरुड़, उल्लू की आँख का हड्डी वाला छल्ला औसतन इतना बड़ा होता है जितनी कि गोली की एक डिबिया।

सिर पर आँखें—

आँखों का स्थान सिर पर होने पर बहुत कुछ बातें निर्भर हैं। मनुष्यों, बन्दरों और बिल्लियों को सुअरों और घोड़ों की अपेक्षा अधिक अच्छा दिखलाई देता है। जब दोनों आँखें सीधी सामने की ओर लक्ष्य करती हैं, तब उन्हें दोहरे ताल की दूरबीन का-सा

चित्र दिखलाई देता है। केवल एक और से देखने से उन्हें एक धूंधला या आंशिक चित्र दिखलाई देता है। किन्तु साथ हो ऐसी आँखें पोछे से या बगल से आने वाले खतरे का आभास पा जाती हैं। यह बात घोड़े और हिरन के समान जानवर के लिए बड़े महत्व को होती है।

पानी वाले जानवरों की आँखें बहुधा उनके सिर के ऊपर होती हैं। घड़ियाल, दरियाई-गैंडा या मेंढक सारा शरीर पानी में डुबाये रख सकते हैं, और केवल अपनों आँखों को पानी के ऊपर रहने देते हैं और देखकर निश्चित करते हैं कि धरती पर निकलना सुरक्षित है या पानी के भीतर ही रहना अधिक अच्छा है।

स्वतन्त्र रूप से काम करने वाली आँखें—

मछलियों और गिरगिटान के समान कुछ सरीसृपों में आँखें स्वतन्त्र रूप से काम करती हैं। गहरे पानी में रहने वाली कुछ मछलियों और घोंघों, दस पैर के समुद्री केकड़े, कांगा मछलियाँ तथा अन्य केकड़ों के समान समस्त जीवों की आँखें केवल इस प्रकार को बनी ही नहीं होतीं कि वे स्वतन्त्र रूप से काम कर सकें, अतिक बं एक लम्बी डण्डी के सिरे पर लगा हुई रहती हैं, जिसको प्रयोग न किये जाने पर नली में लपेट लिया जा सकता है और सिकोड़ कर अलग हटा दिया जा सकता है।

तीन आँखों वाला जानवर—

सब को आँखों की किक करनी पड़ती है। हमारी आँखों के दो पलकें होती हैं। बहुत से स्तनपायियों और सारी चिड़ियों के तीन पलकें होती हैं, तीसरी पलक आँख के आर-पार भीतर की ओर से बाहर की ओर चलती रहती है। ये पलकें अशु-प्रन्थियों

के साथ मिल कर, यदि वे हुईं तो, आँख को धूल मिट्टी से साफ रखती हैं।

थोड़े से अमेहदण्डीय जीवों में, जैसे कि राज-केकड़े में एक तीसरी आँख होती है, जो उनके सिर की ओटी पर होती है। न्यूज़ीलैण्ड में एक सरीसृप होता है जो बहुत ही कम मिलता है और जिसे 'टुआटेरा' लिपकली कहते हैं। इसके तीसरी आँख की निशानी अब तक बाकी है, जो उसे अपने पूर्व ऐतिहासिक काल के पूर्वजों से प्राप्त हुई है, किन्तु वह अब वास्तविक काम की नहीं रही है। बहुत ही थोड़े जीवों ने, जैसे कि केन्दुकी की गुफा में रहने वाली मछलियों ने घोर अन्धकार में रहने के कारण अपनी आँखें गँवा दी हैं और उनकी देखने की शक्ति जाती रही है।

कान और सुनना

कान अपने सरलतम रूप में कस कर तभी हुई एक भिल्ली है जो एक बक्स पर मढ़ी हुई है। यही बक्स प्रतिध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का काम करता है। आस-पास की हवा के स्पन्दन प्रतिक्रिया-स्वरूप कर्णोदय में कँपकँपी उत्पन्न करते हैं, और इसी को संज्ञा-वाहिनो द्वारा मस्तिष्क के ग्रहण करने का नाम सुनना है। अतएव श्रवण करने और स्पर्श करने की क्रिया दोनों एक ही हैं।

टाँगों के द्वारा सुनना—

'ओसीफोन' नामक मशीन के द्वारा वे लोग जिनके कर्णोदय नष्ट हो गये हैं, अपने गले की हड्डियों या कोहनियों के जरिये से

सुन सकते हैं। शब्द से जो स्पन्दन उत्पन्न होते हैं वे मस्तिष्क तक पहुँचाये जाते हैं और परिणाम होता है एक प्रकार की सुनने की किया ! साँपों, मछलियों, केकड़ों और घनेक कीड़े-मकोड़ों के यद्यपि वास्तविक कान नहीं होते, अतः वे बहुत कुछ इसी प्रकार सुनते हैं।

बहुत से जानवर जो अपने कण्ठ से आवाज करने या गाने के योग्य होते हैं, सुन सकते हैं। एक मधु-मक्खी या एक मच्छर कदाचित् स्वयं अपनी भनभनाहट नहीं सुन सकते, क्योंकि वह हवा में होकर प्रगति करते रहते हैं। किन्तु एक भाँगुर की चिरचिराहट उसके जीवन में एक महत्व की बात होती है, वह उसका प्रेम-गीत होता है। भाँगुर एक सरल कर्णोदय की सहायता से, जो बजाय उसके सिर के उसकी जंघाओं या अगली टाँगों में होता है, अपने साथी की आवाज सुन सकता है। केकड़े की आकृति की मछली और 'पिटॉल प्रॉन' के सहशय कुछ छिलकेदार मछलियाँ जोर की आवाज कर सकती हैं, और यह विश्वास किया जाता है कि उक्त आवाजें सुनने वाले बालों के कर्णोदयों के द्वारा सुनी जा सकती हैं, जो टाँगों के चारों ओर लंगे होते हैं और केन्द्रीय-स्नायु मंडल से सम्बन्धित होने के कारण मस्तिष्क मे सन्देश ले जाते हैं।

मंडकों और छिपकलियों के कान होते हैं, क्योंकि वे बहुधा बोलने वाले जीव होते हैं, किन्तु हमारे मापदण्ड से साँप बहिरे होते हैं। सँपेरे के खेल के साथ जो बाना नित्य बजता है वह केवल एक पेशे वाले का छल है। मछली की तथाकथित कान की हड्डियाँ मुख्यतः उसका संतुलन बनाये रखने के काम आती हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमारे कानों की 'कस्टैशियन ट्यूब' हुई अर्धगोलाकार वायु प्रणालियाँ हमारा संतुलन बनाये

रखने में सहायक होती हैं। इन वायु-प्रणालियों के दोष सीधा चलने में बाधा उपस्थित करते हैं और साइकिल पर चलना तो और भी कठिन कर देते हैं।

कानों की दूरी--

कानों की परिवृद्धि पक्षियों में खूब होती है, विशेषतः रात में उड़ने वाले उल्लुओं में, किन्तु यह परिवृद्धि स्तनपायियों में अपने उच्चतम शिखर पर पहुँचती है। अन्य पशुओं से हमारी बुद्धि पर्याप्त बढ़ कर होने पर भी, बहुत से स्तनपायियों की तुलना में हमारी श्रवण-शक्ति दुर्बल है। जिन आवाजों को ऊँची या नीची होने के कारण हम सुन नहीं सकते, उन्हें एक कुत्ता ग्रहण कर लेता है।

कान का बाहरी भाग, जो एक ध्वनि-पटरे का काम करता है, एक जीवधारी की श्रवण-शक्ति का उत्तम इंजिन होता है। वह अपनी उच्चतम अवस्था को पहुँच जाता है—कभी-कभी एक गज की दूरी पर—जैसे कि हाथी में, और हिरन और खरगोश में भी वह एक पर्याप्त ऊँचे मापदण्ड तक पहुँच जाता है। यह बात भी बड़ी विचिन्त है कि जिराफ़ की श्रवण शक्ति काफ़ी उन्नत होती है, यद्यपि वह बिना वाणी-तन्तु वाला और परिणामतः एक चुप जीव होता है। सील और हँसे मछलियों में श्रवणशक्ति कम होते-होते एक विलीन विन्दु तक पहुँच गई है। भींगा मछली में कान समतुल्य का केवल एक छंग होता है। भींगा के चारों ओर आठ छोटे-छोटे थैले लगे रहते हैं। इनमें ऐसा तरल पदार्थ होता है जिसमें चूने के कण तैरते रहते हैं। जब चूने के कण थैलियों की बगलों से टकराते हैं तब भींगा को सूचना मिल जाती है कि वह औंधी होकर तैर रही है और तब वह स्वतः अपने को ठीक कर लेती है।

मस्तिष्क और भावना

यह बात अवश्यकः सत्य है कि दिमाग सदर दफ्तर होता है। शरीर के प्रत्येक अंग से संज्ञा-बाहिनी उसके पास सन्देश ले जाती हैं और यदि कोई स्नायु काट दी जाय तो कोई सन्देश नहीं आ सकता। शरीर के किसी अंग में चेतनाशून्य या सुन्न करने वाली औषधि के लगा देने से उस स्थान की संज्ञाबाहिनी, जो शरीर की तारवर्णी होती है, बेकाम हो जाती है। किन्तु आमतौर से चेतना-शून्य करने वाली एक औषधि दिमाग ही को बन्द कर देती है, जो सन्देश प्रहण करने का स्टेशन होता है।

एक मस्तिष्क भी उसी पदार्थ का बना होता है जिससे कि स्नायु बने होते हैं। किन्तु वह भूरा पदार्थ, जिसे समझा जाता है कि सारी विचारशक्ति के लिये जिम्मेदार है, सारे दिमाग पर एक विभिन्न गहराई के अनुसार एक स्तर में फैला रहता है। दिमाग का एक व्यौरेबार मानचित्र बनाना असम्भव है। किन्तु वह बात सर्व-स्वीकृत है कि सोचने की शक्ति बहुत कुछ अन्य-भाग में केन्द्रित होती है, दृष्टि पिछले हिस्से में होती है और मस्तिष्क का पृष्ठ भाग शरीर के समतुल्य को वश में रखता है।

अप्रधान-मस्तिष्क कूलहों में केन्द्रित होता है—

मानव मस्तिष्क की तुलना में संसार का कोई भी दूसरा अंग अधिक पेचीला नहीं होता। एक औसत मनुष्य का दिमाग तौल में सवा सेर का होता है, और यह उसके सारे वज्रन का मोटे तौर से साठवाँ हिस्सा होता है। एक हाथी का दिमाग तौल में साढ़े सात सेर का हो सकता है किन्तु यह उसके सारे न शरीर का १/६०० वाँ भाग होता है।

मस्तिष्क और भावना]

ऐसा तुच्छ दिमाग भी सरीसूपों के दिमागों से बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ा होता है। 'डिनासौर' (एक बृहत्ताकार रेंगने वाला जानवर) के नष्ट होकर विलीन होनेका बहुत कुछ कारण उसका सीमित मन था। उदाहरणार्थ 'रेगोसौर' का दिमाग हाथी के दिमाग के अनुपात में अत्यन्त छोटा था। वह इतना छोटा था कि चास्तविक दिमाग से कई गुना बड़ा एक अप्रधान-दिमाग उसके कूलहों में केन्द्रित था जो उसकी पिछली टाँगों की गति को संचालित करता था और उसकी बड़ी पैঁछ को हिलाता था।

अमेरुदण्डीय जीवों की भी ऐसी ही दशा है। उदाहरणार्थ केकड़ों और मविखयों को ले लीजिये, इनके चारतविक मस्तिष्क तो बड़े नहीं होते हैं, किन्तु इनके "उदर मस्तिष्क" इनकी टाँगों के जोड़ पर केन्द्रित होते हैं। भींगा मछली में या समुद्री वायु-पुष्पों में कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिसे मस्तिष्क कहा जा सके—उनके तो केवल स्नायुओं का एक उलझा हुआ-सा गुच्छा होता है और कोई केन्द्रीय रेशेन नहीं होता।

इसके यह अनुभव होगा कि कीड़े-मकोड़ों या उन्हीं के समान जीवों की तुलना करना कभी-कभी बड़ा आनितजनक होता है। एक स्तनपायी की अपेक्षा एक यंत्र से किसी कीड़े की तुलना करना अधिक उचित है। यदि उनका अंग-भंग भी हो जाता है, तो भी वे मशीन की तरह अपने काम को जारी रखने का प्रयत्न करते रहते हैं मानों वे अपनी साधारण परिस्थिति में ही हैं। अमेरुदण्डीयों के प्रति पीड़ा शब्द के प्रयोग करने का कोई अर्थ नहीं होता और सम्भवतः यही हाल निम्नतम कोटि के रीढ़ वाले अनेक जानवरों का भी है।

जानवरों की बुद्धि--

यद्यपि चीटियाँ, मधु-मविखयाँ और वर्ण अपना घर बनाती हैं, कुएँ बनाती हैं, बाग लगाती हैं, गायें पालती हैं और उनका

एक विशेष प्रबन्ध होता है, तो भी वे मनुष्य के समान बुद्धि नहीं रखतीं। उन्हें जो पाठ जन्म हो से मिलता है उससे आगे वे नहीं जा सकतीं और न कोई नया काम कर सकती हैं। उनमें से जो जिस काम के लिए बनाई गई हैं उसके अतिरिक्त वह दूसरा काम नहीं कर सकतीं। वे बिलकुल मशीन की तरह होती हैं। अगर एक बर्द का पिछला हिस्सा काट दिया जाय तो भी वह अपने सामने रखी हुई खाद्य-सामग्री को उस समय तक खातो रहेगी जब तक वह मृत्यु के हवाले न हो जाये।

यह सिद्ध हो चुका है कि मेरुदण्डीय जानवरों का मस्तिष्क अमेरुदण्डीय जानवरों की अपेक्षा उत्तमतर होता है। साथ ही यह भी प्रमाणित कर दिया गया है कि इनमें भी बुद्धि उनके मस्तिष्क की उस बड़ाई और छुटाई पर निर्भर है जो उनके शरीर के अनुपात के अनुसार हो। कोरी बड़ाई-छोटाई से बुद्धि की माप ठीक-ठीक नहीं होती। वैज्ञानिकों ने यह भी मालूम कर लिया है कि मस्तिष्क का भारी होना ही पर्याप्त नहीं है किन्तु उसका वर्ग और वजावट भी कांक्षी प्रभाव रखते हैं। मस्तिष्क जितना साफ़ और चिकना होगा उसमें उतनो ही बुद्धि कम होगी। उसमें रेखाओं का होना आवश्यक है। मस्तिष्क में जितनी अधिक रेखाएँ होंगी उतना ही उसका वर्ग बढ़ जायेगा और बुद्धि पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि यद्यपि कुछ जानवरों का मस्तिष्क मनुष्य से बड़ा है, जैसे हैज का, तो भी वे मनुष्य से बुद्धि में कम हैं।

जानवर प्रायः अपनी स्वयम्भू प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं किन्तु देखा गया है कि कुछ जानवर सोच समझ कर अपनो बुद्धि से भी किसी काम को पूरा करते हैं। निश्चित समय से और नियत स्थान पर जानवरों को खाना मिलने से वे ठीक पर उक्त स्थान पर पहुँच जाते हैं। इसके एक नहीं अनेक

अनुभव विद्वानों ने किये हैं। उनके द्विए उदाहरणों से पता चलता है कि पशु-पक्षियों में भी विचारशक्ति सौजूह है और वे कभी सोच-समझ कर भी काम करते हैं।

जानवरों में बदला लेने की भावना भी इस बात का प्रमाण है कि उनमें स्मरण रखने और सोचने की शक्ति होती है। एक दर्जी से हाथी के बदला लेने की कहानी तो बहुत लोगों ने अपने स्कूल-जीवन में पढ़ी होगी कि कैसे एक हाथी ने एक दर्जी की डुकान पर गँदला पानी छिड़क दिया था, क्योंकि उस दर्जी ने उसकी सूँड में सुई चुभो दी थी। हमारे मुहाल में चेता नामक एक गड़रिया रहा करता था। एक बार उसने एक गाय को लाठियों से बहुत मारा था। एक दिन सौक्रा पाकर उस गाय ने चेता को गिरा दिया और गिराकर अपने सोंगों से खूब मारा।

दूसरा उदाहरण एक हाथी के बदला लेने का इस प्रकार है :—

“धुवरी राज्य के सलकेवा नामक स्थान में कुछ वर्ष पूर्व खीला सूत्रधार ने एक हाथी को, जिसका वह महावत था, पीटा था। कुछ दिन बाद वह एक दूसरे मालिक के मातहत एक नए हाथी का सहावत बनाया गया।

“एक दिन जब कि पुराने हाथी का महावत और खीला अपने-अपने हाथियों पर काम पर से लौट रहे थे, तो राते में एक स्थान पर रुक कर आपस में बातें करने लगे और चिलम पीते लगे।

“जिस समय कि एक महावत दूसरे को चिलम दे रहा था तब उस हाथी ने जो पहिले खीला के आधीन था, यक्कायक खीला

को अपनी सूँड से दूसरे हाथी की पीठ पर से घसीट लिया और अपने महावत के रोकने पर भी खीला को कुचल कर मार डाला।”

दो चीजों को अलग-अलग जान लेने की योग्यता भी जानवरों में बुद्धि की उपस्थिति का प्रमाण देती है। इसके भी अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे मधु-मक्खियों का भिन्न-भिन्न रङ्गों को पहिचानना आदि अक्सर देखा गया है। जानवरों की स्मरण शक्ति के तो अनेक उदाहरण पुस्तकों में भरे पड़े हैं, जिनमें इन बातों का जिक्र है कि वे बहुत समय तक कुछ बातें याद रखते हैं। इसी-स्मरण शक्ति के द्वारा विवेचना करने की शक्ति की उत्पत्ति होती है।

मेरी एक गाय थी जिसे मैंने अपने एक मित्र को दे दिया था। और वे उसे अपने गाँव ले गये थे, जो कानपुर शहर से पन्द्रह-बीस मील दूर था। तीन वर्ष के पश्चात् एक दिन वह गाय मेरे दर्वाजे पर आकर रँभाने लगी और आस-पास ही कुछ देर तक घूमती रही। वह इतनी दुर्बल हो गई थी कि हम लोगों ने उसे शुरू में पहिचाना ही नहीं, कदाचित् मेरे मित्र ने उसे ठीक तरह से नहीं रखा था। जब हम लोगों ने उसे दो-तीन दिन बाद पहिचाना तो उसे फूल बाग में बैधवा दिया। इन दो-तीन दिनों में वह कहीं गई नहीं और हम लोगों के घर के आमने-सामने ही घूमती रही। वह हमारे घर की ही बछिया थी। हमारे यहाँ शुरू से पली थी और यहीं उसके दो बार बच्चे भी हुए थे। उसके पाँच थन थे और वह पाँचों से दूध देती थी। तीन वर्ष के पश्चात् भी वह अपना पुराना घर नहीं भूली और स्वयं बिना किसी की मदद के अपने घर आ गई और हम लोगों के पहिचान लेने पर बड़ी प्रसन्न भी मालूम देती थी। यह जानवरों की स्मरण-का एक उदाहरण था।

शिक्षा से बन्दर और कुत्ते ऐसी अनेक बातें सीख जाते हैं जो वे स्वभावतः नहीं करते। जैसे एक कुत्ते का जलती हुई लाल-टेन लेकर चलना और बन्दरों का पंखा खोना आदि बातें ऐसी हैं जो वे अपनी स्वयम्भू प्रवृत्ति से नहीं करते किन्तु ये हैं उनकी शिक्षा के प्रभाव। बर्मा में हाथी लट्टे ढोने का काम करते हैं, जो उन्हें सिखाया जाता है। ये सारी बातें जानवरों की स्मरण-शक्ति और उनमें बुद्धि के उपस्थित होने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

चींटियों और शहद की मिलियों में अपने घोंसलों के मार्ग स्मरण रखने की शक्ति तो होती है किन्तु दूर छोड़ दिये जाने पर उन्हें अपने बिल का मार्ग हूँड़ने में बुद्धि और अनुभव से काम लेना पड़ता है। उनमें अपने साथियों को विशेष बातों की खबर देने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। नक्कल उतारने की बात तो तोता-मैना आदि पक्षियों में प्रायः सभी को मालूम है और नक्कल उत्तर सकती है जब किसी घोज को समझ लिया जाय। तभी उत्तर सकती है कि जब तदाहरण तो अनेक हैं। इन सबसे बन्दरों के नक्कल उतारने के उदाहरण तो अनेक हैं। अबश्य प्रमाणित होता है कि जानवरों में थोड़ी-सी समझ तो अबश्य है किन्तु वे मनुष्यों की तरह गम्भीर प्रश्नों को सुलझाने में असमर्थ होते हैं। अतः उनमें बुद्धि का होना तो प्रमाणित है, प्रश्न मात्रा की कमी और वेशी का रह जाता है।

जानवरों में दैत्य

विकृत और विलक्षण तथा दैत्याकार प्राणी पूर्व-पोषणिका ग्रन्थि की अति-क्रिया से जीव जाति की प्रत्येक शाखा में उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में जीवधारियों का प्रत्येक मुख्य स्मूह एक या अधिक द्वच शिखर तक पहुँचा है। और

इस प्रयत्न में उनके कुछ सदस्य परिवृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुँच गए हैं। आज उषण-रक्त स्तनपायी, जो अपने बच्चे जीवित उत्पन्न करते हैं, और उन्हें दूध पिला कर पालते हैं, मैदान में सबसे आगे हैं।

संसार में सबसे बड़े स्तनपायी--

आजकल के पृथ्वी पर रहने वाले स्तनपायियों में हाथी ही सबसे बड़ा होता है। इसकी ऊँचाई १२ फुट से अधिक नहीं होती। आगे चलकर इसके अधिक बढ़ने में सन्देह है। जिस हाथी का बज्जन छः टन से अधिक होगा उसकी टाँगों को इतना मोटा होना पड़ेगा कि उसका चलना लगभग असम्भव हो जायगा। प्राचीनकाल का दैत्याकार गैंडा बहुत पतला होता था किन्तु अब वह नेतनावृद्ध हो गया है। १८ फुट लम्बा जिराफ जो आज भी पाया जाता है, बनावट में बड़ा हल्का होता है। पानी में बज्जन की कोई विशेष गणना नहीं होती। तरल मार्ग अपेक्षा-कृत बोझ को नगण्य बना देता है और इसीलिये १०० फुट से अधिक लम्बी और तौल में ३० हाथियों के बराबर गन्धक-ह्लेल मछली सरलता से चल-फिर सकती है। तुम हो जाने वाले कीड़े-मकोड़ों में से भी कुछ ऐसे थे जो लम्बाई में १०० फुट तक पहुँच गये थे किन्तु उनका शरीर हाथी से बड़ा कभी नहीं हुआ। इनमें से बहुत से सम्भवतः पानी के जीव थे।

उड़ने वाले भारी-भरकम जीव--

ह्लेल मछली की तरह और दूसरे भी तैरने वाले जानवर होते हैं जिनका आकार बहुत बड़ा होता है। शार्क मछली ५० फुट लम्बी होती है, यह हाथी-सील से १० फुट और बड़े से बड़े ८ से २० फुट तथा दैत्याकार दो-शाखा मछली से ४० फुट

जानवरों में दैत्य ।

से अधिक लम्बी होती है। ये सस्त जीव फेफड़ों या गलकड़ों के द्वारा साँस लेते हैं, क्योंकि वृद्धिकार वृद्धि के लिये इनका होना आवश्यक है।

कुछ उड़ने वाले जीव भी एक प्रभावशाली आकार प्राप्त कर लेते हैं, किन्तु इस तथ्य से कि वे उड़ते हैं, उनकी लम्बाई-चौड़ाई सीमित हो जाती है। लगभग पाँच से र का शारीरिक बोझ ही हवा में पर्याप्त ऊँचाई तक उड़ सकता है; इससे अधिक बोझ उड़ने में बाधक होता है।

चूहों के बराबर बड़े कीड़े—

कीड़े नलियों की एक पेंचीली पद्धति के साथ साँस लेते हैं, और उन्होंने जो बड़े से बड़ा आकार प्राप्त किया है यदि कोई कीड़ा उसे पार कर जाये, तो सारी रचना ढह जायेगी। अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के गुबरीले दैत्याकार कीड़े होते हैं, वे लगभग चूहों के बराबर बड़े होते हैं। भारतीय 'एटलस' परिगा पंख फैलाने पर एक फुट का होता है, वह प्राचीनकाल की अजगर मक्खी से केवल ६ इक्के छोटा होता है।

केकड़ों और झोंगाओं के समान छिलके या ढक्कनदार जीव गलकड़ों से साँस लेते हैं और कीड़ों की अपेक्षा उनके ढक्कन या सिपिखाँ अधिक कड़ी होती हैं, किन्तु इन निपियाँ को वे नियन्त्रित समय पर छोड़ देते हैं, और इस क्रिया में जानवर को जो परिश्रम करना पड़ता है उससे उसका फैलाव सीमित हो जाता है। 'कोयला-काज़' का दैत्याकार समुद्रो विच्छूलम्बाई में जीव कुट का होता था, किन्तु वर्तमानकान का सप्तसे बड़ा जीवित केकड़ा, अर्धान् जापान का सकड़ो-रेकड़ा एक भिरे से दूसरे भिरे तक फुट तक फैल सकता है परन्तु उसका शरीर एक सुन्दर के भिरे से बड़ा नहीं होता।

मनों वज्जन के घोंघे—

मीठे पानी की अपेक्षा समुद्र का जल अपने धनत्व के कारण वज्जन को घटाने में अधिक प्रभावशाली होता है; अतएव हमें समुद्र में ऐसे घोंघे मिलते हैं जिनकी सिध्पियाँ दो फुट लम्बी होती हैं। उदाहरणार्थ अमरीका के तक्कुए के अनुसार पतले घोंघे हैं—ये धरती या नदी के किसी भी घोंघे से चौंगुने लम्बे होते हैं। अनुद्योगी जीवन व्यतीत करने के कारण घोंघा मछली और भी बहुत बड़ी हो सकती है, और आस्ट्रेलिया में ऐसे 'क्लैम्स' होते हैं जिनकी सिध्पी एक गज से भी अधिक लम्बी होती है और जिनका वज्जन कई मन होता है।

अपने अंगों की सहायता के लिये जितना छोटा कंकाल या उसी के समान रचना, एक जानवर की होती है उतनी ही अधिक रुकावटें उसके विस्तार में होती हैं। झोंगा मछली बहुत कम एक गज से अधिक बड़ी हो पाती है, और गहरे समुद्र में रहने वाले थोड़े ही से ऐसे समुद्री फूल होते हैं जो लम्बाई में ६ फुट तक पहुँचते हैं, और उनकी स्पश-भुजायें दो गज तक का व्यास फैलाती हैं। सबसे बड़े एककोषीय जीव जो मध्य-समुद्र में उतरते हैं, मनुष्य की डँगलियों के नाखून के बराबर होते हैं।

जंतुओं में युद्ध

मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसने लड़ाई में प्रयोग करने के लिये बहती हुई आग और विषेली गैस को पूर्णता तक पहुँचा दिया हो। अन्य जानवर तो अपने प्राचीन शक्ति—दाँतों और पंजों ही पर मुख्यतः भरोसा करते हैं। किन्तु मृत्यु को ध्वंस करने वाले जो हँग रवयं मनुष्य ने हूँढ़ निकाले

फेफड़े और बिना फेफड़े]

हैं उसके बहुत पहिले कुछ जानवरों ने आधुनिक भयंकरता के इन स्वरूपों को सोच लिया था ।

ज़हरीली गैस द्वारा आक्रमण-

कुछ जानवर एक प्रकार की ज़हरीली गैस का प्रयोग करते हैं किन्तु यह बात निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकती है कि उनकी शक्तिशाली गत्थ, जो हमें अति अप्रिय मालूम देती है स्वयं उनकी जाति वालों को आकर्षक न मालूम देती हो । केनाड़ा के स्कुङ्क (यह एक माँसाहारी जीव आकार में विल्जी के बराबर होता है और उस के शरीर पर काले और सफेद ढाग होते हैं, यह अपनी रक्षा के लिये पोछे से बड़ा सख्त बदबू निकालता है जिसे कोई सहन नहीं कर सकता) की दुर्गत्थ बड़ी ही अप्रिय और भिन्ना देने वाली होती है । मालूम ऐसा देता है कि उसे अपनी भयंकर शक्ति का ज्ञान होता है, और यद्यपि वह एक विल्जी से बड़ा नहीं होता, फिर भी वह अपने से बड़े जानवरों का मार्ग रोककर खड़ा हो जाता है और उन्हें उस ओर से निकलने नहीं देता । उसकी पैঁछ के तीचे की प्रन्थियों से निकला हुआ तरल पदार्थ यदि किसी मनुष्य पर पड़ जाता है तो सिवा नये बख्त बदलने के मनुष्य के पास कोई दूसरा उपाय नहीं रहता ।

दीमक—

दीमकों या नक्केद चीटियों ने एक भयंकर अस्त्र निकाल लिया है । धरती के भीतर दीमक बड़े-बड़े नगर बनाते हैं, जिनकी रक्षा विशेष प्रकार के दीमक करते हैं, जिन्हें चैनिक कहा जाता है । जब कोई शत्रु दिखलाई पड़ता है तब वे दीमक आगे लकड़ते हैं और आक्रमणकारी पर एक ऐसा अम्ल-उत्पाद छिड़क

देते हैं जो हवा से सम्पर्क होने पर ठोस बन जाता है। यदि किसी बड़े जानवर पर ऐसा पदार्थ छिड़का जाता है तो उसे केवल एक अरुचिकर चिपचिपाहट का भान होता है, किन्तु एक कीड़े पर उक्त पदार्थ के पड़ने पर वह अन्नरशः पथरा जाता है और उसी पकार बिलकुल निकम्मा हो जाता है जैसा कि एक मनुष्य उस समय बेकार हो जाता है जब कि उसके ऊपर लेंदा या गोंद की एक मोटी तह चढ़ा दी जाय।

दो-शाखा मछली के धुएँ का परदा

दहात मे इधर-उधर घूमने पर यदि अकस्मात् कोई पत्थर का टुकड़ा उलट दिया जाता है, तो कभी-कभी धीमी-धीमी फटा-फट की आवाजें सुनकर और उनके पीछे कड़ुये धुएँ के नन्हे गुच्छे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। यह गोलावारी करने वाले पतिंगों का बाँध होता है जिन्हें छः बुन्दिया कहते हैं, क्योंकि उनके सख्त परों पर छः पीले गोल निशान होते हैं। डर जाने पर छः बुन्दिया तीव्रता से उड़ जाने वाले तरल पदार्थ की एक बूँद निकालता है, जो सुनाई देने वाले धड़ाके के साथ फटती है— यह धड़ाका हमारे लिये तो बिलकुल नगण्य होता है किन्तु एक दूसरे पतिंगे को ऐसा चौंका देता है कि वह उलट कर चित्त गिर पड़ता है।

दो-शाखा मछली अष्टपद और उन्हीं के समान अन्य घोघे डर जाने पर बड़ी मात्राओं में अपने शरीर से ऐसी स्याही निकाल कर बाहर फेंकते हैं जो पानी को ऐसा मेघाच्छन (गँदला) कर देती है कि इस कृत्रिम कोहरे की आड़ में ये जीव भाग कर अपनी जान बचा लेते हैं। इस स्याही को सीपिया कहते हैं। यह सीपिया या स्याही मनुष्य के भी काम आती है, विशेष कर ५% के काम में। साधारण समुद्र-झीट, पौधा-कीट, समुद्री

जानवरों में दैत्य]

खरगोश और विभिन्न प्रकार के चट्टानी घोंघे शी इसी प्रकार के उपायों से काम लेते हैं। किन्तु वे काली भूरी स्याही के स्थान पर वैजनी स्याही से अपना पीछा करने वालों को धोखा देते हैं।

शत्रुओं को प्रकाश से चकाचौंध करना—

महासागर के गहरे गढ़े के अन्धकार में स्याही के द्वारा बच कर भाग निकलने का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। अतः गहरे समुद्रों की रहने वाली दो-शाखा मछली अपने शत्रुओं को काले धुएँ से अन्धा नहीं करती किन्तु प्रकाश से उन्हें चकाचौंध करके खतरे से भाग निकलती हैं। इस प्रकार की दो-शाखा मछलियाँ और गहरे समुद्र की विभिन्न झाँगाएँ नीले हरे चमकने वाले तरल पदार्थ के धूमते हुए बादलों की पिचकारी छोड़ती हैं। इससे उनके शत्रु वैसे ही पूर्णतया चकाचौंध हो जाते हैं जैसे कि बिजली का टार्च अँधेरे में एक चूहे या खरगोश को चकाचौंध कर देता है।

पशु-संग्राम की एक दूसरी नक्कल जो हमने की है वह है पानी की बन्दूक। पूर्वी देशों की भीलों और नदियों में रहने वाली एक छोटी मछली को तीरन्दाज कहते हैं। नदी किनारे के घोंघों और धास पर बैठे हुये कीड़ों और पतिंगों पर यह इतने बेग से पानी की धार या पिचकारी छोड़ती है कि ये उलट कर अपने स्थान से गिर पड़ते हैं और पानी में आते ही यह उन्हें खा जाती है। इस तीरन्दाज का मुँह एक लम्बे थूथुन के रूप में आगे की ओर बढ़ा रहता है। इसी को देखकर निश्चय हीं लोगों ने पानी की बन्दूक का आविष्कार किया होगा, जिसके द्वारा प्रकृति-प्रेमी भन-भन करने वाली चिड़ियों और बड़ी-बड़ी तितिलियों को मारते हैं जिससे उनका अंगभंग नहीं होता।

हाथ और पैर

जिस प्रकार कुछ जानकार लोग आदमी का हाथ देखकर यह बता सकते हैं कि वह क्या काम करता है, आया वह मज़दूर है या कलाकार, उसी तरह शरीर व्यवच्छेदक भी जानवरों की गतिविधि को जान जाता है, क्योंकि हाथ एक जीवधारी के जीवन की गतिविधि की कुज्जी होते हैं।

तीस ऊँगलियाँ—

प्रथम हाथों की आवृति लाखों वर्ष पहले उस समय हुई थी जब कि मछलियों में सुफनों की परिवृद्धि हुई थी। एक सुफना केवल एक हाथ होता है किन्तु उसमें १० से लेकर ३० तक ऊँगलियाँ होती हैं जिन्हें किरणें कहते हैं। जब मछलियाँ पानी से निकल बाहर रेंग गईं तब उन्हें इतनी ऊँगलियों की आवश्यकता नहीं रही। फिर तो ५ या इससे भी कम से उतना ही काम हो जाने लगा।

मेंढक, गोह और सरीसूप सब के चार या पाँच ऊँगलियाँ होती हैं। समुद्री कल्पुण के हिलाने वाले अंग में पाँच ऊँगलियाँ ढकी रहती हैं। जब चिड़ियों के पंख निकले और उन्होंने उनका प्रयोग उड़ने में किया तब ऊँगलियाँ परित्याग कर दो गईं। आज संसार का केवल एकमात्र पक्षी ब्रेजिल का होटजीन ठोक तरह से उड़ना सीखने के पूर्व अपने प्रारम्भिक जीवन में दो ऊँगलियाँ रखता है जिनकी सहायता से वह पेड़ों पर चढ़ सकता है।

चढ़ने में सहायता देने वाली कटिया के रूप में हाथ—

स्तनपायियों ने सदा अपने हाथों और पैरों की ऊँगलियों पर रोसा किया है, और हाथों की ऊँगलियों में आश्वर्यजनक

सुधार भी हो गये हैं। बन्दरों तक ने उनका प्रयोग करने के जीसों विभिन्न ढंग मालूम कर लिये हैं। उनमें से बहुतों ने हमारे सदृश्य ही चार डँगलियाँ और एक अँगूठा रख छोड़ा है। किन्तु भकड़ी, बन्दर और औरंग-उटझ चढ़ने में सहायता पहुँचाने वाले कटिया के रूप ही में अपने हाथों का अधिक प्रयोग करते हैं, अतः उनका अँगूठा घट गया है या बिल्लीन भी हो गया है। मेडेगास्कर का “ऐ-ऐ” नामक लीमर बन्दर बाँस के डण्ठलों से से कोये बीन-बीन कर निर्बाह करता है। यह क्रिया करने में अकड़ी की टाँगों के समान डँगलियों से काम लेना पड़ता है। और उसकी तीसरी डँगली जिसे चुनने का अधिकतम काम करता पड़ता है, एक तार के टुकड़े की तरह पतली होती है।

चढ़ने वाले औजारों में हाथ ही सबसे उत्तम होते हैं और कुछ लीमर बन्दरों ने उँगलियों और हथेली पर मोटी-मोटी गद्दियों की परिवृद्धि करके अपने हाथों में उन्नति कर ली है। पेड़ों पर चढ़ने वाले मेंढकों और घरेलू छिपकलियों के ऐसी इचिपकने वाली गद्दियाँ होती हैं कि वे खिड़की के शीशों और कमरों की छतों (सीलिङ्ग) पर चल सकती हैं। अफ्रीका का एक लीमर बन्दर चढ़ने के पहले अपनी गद्दियों को चाट कर गीला कर लेता है और इस प्रकार वे अधिक उपयोगी हो जाती हैं।

चलने के लिये हाथ—

बिल्ली की नसल ने उँगलियों के नाखून इतने मजबूत बना लिये हैं कि वे माँस के फाड़ डालने के लिये पर्याप्त होते हैं। रीछ के पंजे चार इच्छ लम्बे तक हो सकते हैं और एक पेड़ की कठोरतम छाल को चीर सकते हैं। चींटी-खोरा इससे भी आगे बढ़ गया है। उसके हाथों को सारी शक्ति बीच को दो डँगलियों के

नाखूनों में निर्विष्ट हो गई है। उसके ये पाँच इच्छा लम्बे अखण्ड मिट्टी के बड़े-बड़े धुसरों को खोद सकते हैं।

समस्त चरने वाले और घास-पात खाने वाले जानवर जिन्हें अपने भोजन एकत्रित करने के लिये अपने ओठों और थूथुनों पर भरोसा करना पड़ता है, अपने हाथों को केवल चलने के काम में लाते हैं। हजारों शताब्दियों से कड़ी भूमि पर चलने के कारण घोड़े की हाथ की शक्ति एक बीच की ऊँगली में केन्द्रित हो गई है। अनावश्यक ऊँगलियों का अवशेष टाँगों के अग्र-भाग की खाल के नीचे छिपा रहता है। इसके विपरीत सुअंर की ऊँगलियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि उसे दलदल वाली भूमि पर चलना पड़ता है। दबाव पड़ने से वे बाहर निकल आती हैं और पर्याप्त सहायता पहुँचाती हैं। ऐसे हाथ केवल मध्यम आकार के जानवरों की सहायता कर सकते हैं। यद्यपि मुलायम धरती पर चलने के लिये हाथों की पाँचों ऊँगलियाँ बनी हुई हैं किन्तु उन पर इतना अधिक बोझ पड़ता है कि वे मिल कर एक ठोस पाया बन गई हैं और एक इच्छा मोटी खाल की दीवार के भीतर ढकी रहती हैं।

थोड़े से स्तनपायी जल-जीवन में लौट गए हैं, जहाँ से आरम्भ में समस्त स्तनपायी जीवन आरम्भ हुआ था। ह्लेल, समुद्री शेर और दरियाई घोड़े के मछली की तरह के सुक्कने होते हैं, किन्तु यदि उनकी खाल उतार ली जाये, तो पहचानने में देर न लगेगी कि वे ठीक प्रकार से बने हुए हाथ हैं—और यही स्तनपायियों का मुख्य चिन्ह है।

प्रकाश उत्पन्न करने वाले जानवर

समुद्र में बहुधा ऐसा तीव्र प्रकाश दिखलाई देता है कि उसमें पढ़ा भी जा सकता है। यह प्रकाश उन कीड़ों वा जानवरों की चमक होती है जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये जीवित कीड़े अनुबीक्षण यंत्र द्वारा देखे जाने वाले पौधे, केकड़ों के कीट-डिम्ब, और मछलियाँ आदि जब लाखों और करोड़ों की संख्या में एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं तो बड़ा ही तेज प्रकाश और चमक सागर-तल पर प्रकट होने लगती है।

हरे प्रकाश के घेरे वाला कीड़ा—

ग्रेट ब्रिटेन के किनारे पर बसन्त ऋतु के अन्त में यह प्रकाश खूब दिखलाई देता है, जब कि समुद्र इन कीड़ों की अपनी फसल तैयार करता है। इन कीड़ों के प्रकाश से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है, इसका निश्चित पता अभी तक नहीं चला है। इसी प्रकार वहाँ के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर पाया जाने वाला एक बड़ा समुद्री कीड़ा भी भूलभूलैया में डालने वाला होता है।

इस कीड़े की चर्म-पत्र-नली कीड़ा कहते हैं, क्योंकि इसका घर एक नली की तरह होता है। यह अङ्गरेजी अक्षर U की तरह अपना घर छिछले पानी में बनाता है। इस घर का नीचे का भाग रेत पर टिका रहता है और नली के दोनों सिरे पाना के तल से ऊपर निकले रहते हैं। इस घर की ऊँचाई लगभग १ फुट की होती है। नली के भीतर रहने वाला कीड़ा एक ऐसा पदार्थ उत्पन्न करता है जो प्रकाशमान होता है। यह प्रकाश हरे रंग का होता है और नली के सिरे पर अपनी किरणों से एक जाज्बल्यमान घेरा सा बना लेता है। यह प्रकाश ही उस कीड़े

का शत्रु का बन जाता है, क्योंकि प्रकाश को देखकर शिशुरी मछलियाँ और विशेष कर जल-व्याल उस ओर आकर्षित होते हैं और अपने पतले सिरों को नली में घुसेड़ कर कीड़े को बाहर निकाल लेते हैं और उसे चट करके सदा के लिये उस प्रकाश को बुझा देते हैं।

शिकार और साथियों को आकर्षित करना—

अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जानवरों को उनके प्रकाश से दो मुख्य और प्रत्यक्ष लाभ होते हैं अर्थात् शिकार और साथियों का आकर्षित होना। समुद्र की गहराई में जहाँ घोर अन्धकार होता है, मछलियों की एक बड़ी संख्या ऐसी होती है जो खूब तेजी से चमकती हैं। उनका प्रकाश प्रायः हरे या नीले रंग का होता है। उनके जिन अंगों से प्रकाश निकलता है उन्हें 'फोटोफोरेस' कहते हैं और ये मछलियों के सारे शरीर पर हवा और जल निकालने के मार्गों के समान निश्चित रेखाओं में पाये जाते हैं। समुद्र की तह में रहने वाली मछलियों में पेट की तरफ यह प्रकाश होता है जिससे रोशनी ज्मीन पर पड़े और वे सरलता से अपना भोजन ढूँढ़ सकें।

कुछ लुभाने वाली मछलियों के सिरों पर एक लग्नी सी होती है जिसके सिरे पर एक चमकती हुई बल्ब या कुप्पी होती है जिसके द्वारा उसके शिकार उसकी ओर लोभ से आकर्षित होते हैं। जब छोटी-छोटी मछलियाँ उस प्रकाश के पास पहुँचती हैं तो प्रकाश वाली मछली अपना मुँह खोल कर उनको उदरस्थ कर लेती है। मछुए इस बात को जानते हैं, अतः वे इन प्रकाश अंगों को काट लेते हैं और उन्हें अपनी कटियों में लगा लेते हैं, जहाँ वे कई घन्टों तक चमकते रहते हैं। इस प्रकाश को देखकर मछलियाँ कटियों के पास आती हैं और स्वयं शिकार बन

प्रकाश उत्पन्न करने वाले जानवर]

जाती हैं। गहरे समुद्र में रहने वाली कुछ दो-शाखा मछलियों में कई प्रकार के प्रकाश होते हैं—हरे, नीले और लाल आदि।

जुगनू—

जुगनू के मक्की की तरह ६ पैर होते हैं और भाँगुर की तरह दो स्पर्श-अंग होते हैं। इसके मुँह का रंग काला और दुस रंग कालिमा लिये हुये और सारा शरीर नारंगी रंग का होता है। पूँछ के नीचे का भाग चमकता है। यह बहुत कुछ “धनकुटी” से मिलता है। उसकी तरह छूते से चटखता नहीं, वैसे उसी का बड़ा रूप मालूम देता है। सिर का पीला भाग जो सारे शरीर से अलग जुड़ा रहता है काफी चिकना, चमकदार होता है। “धनकुटी” का शरीर दो बराबर हिस्सों में बँटकर बीच से जुड़ा होता है किन्तु जुगनू के तीन जोड़ होते हैं। १/१० हिस्सा काला भाग; १-६ नारंगी भाग, अलग-अलग शरीर में जुड़े होते हैं। यह लम्बा अधिक और चौड़ा कम होता है उसकी दुस के नीचे का जो भाग चमकता है वह जुगनू की चौड़ाई में दो सूत चौड़ी एक रेखा होती है जो पूँछ के एक ओर से दूसरी ओर तक सफेद रंग की बनी होती है। यह कम तेज उड़नेजाला कीड़ा होता है, रेंगता खूब है। परों को तौलता खूब है। परन्तु मालूम ऐसा होता है कि उड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसके पर इसके सिर को छोड़ कर बाकी सारे शरीर को ढके रहते हैं। कदाचित् इसके आँखें नहीं होतीं। यह अँधेरे में घुस कर रहना पसन्द करता है। फासफोरस वाली रेखा के ऊपर जो परों का थोड़ा-सा, लगभग अष्टमांश, भाग होता है वह काला होता है। उसके स्पर्श-अंग बहुत लम्बे नहीं होते। यदि वे किसी वस्तु में हिलग जाते हैं या टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं तो जुगनू उनको अपनी अगली टाँगों से सुलझा कर ठीक कर लेता है। दिन में यह

सोता है और सोते समय अपने स्पर्श-अंगों और पैरों को तथा सिर के काले भाग को समेट लेता है। यदि दिन में उजाजे में में छोड़ा जाय तो रेंग कर अँधेरे में घुस कर बैठने की कोशिश करता है, उड़ता नहीं।

जुगनू के समान कुछ कीड़े मुख्यतः अप नेसाथियों को आकर्षित करने के लिये प्रकाश का प्रयोग करते हैं। जुगनू दो तरह के होते हैं, एक को 'ग्लो-वार्स' और दूसरे को 'फायर-फ्लाइ' कहते हैं। दोनों जातियाँ गुप्तरोला वंश की होती हैं और अपनी परिवृद्धि की प्रत्येक अवस्था में प्रकाश प्रदात करती रहती है। उनके अंडों तक में प्रकाश होता है। इस कीड़े को मादा का, किशोरावस्था में, प्रकाश अत्यन्त तेजोमय होता है। दक्षिणी अमरीका की खियाँ जुगनुओं को माला बनाकर पहिनती हैं।

बिजली उत्पन्न करने वाली मछलियाँ

बिल्ली के बालों या कुछ मनुष्यों के बालों में अँधेरे में कवी करते समय एक हल्की-सी चट-चट की आवाज होती है और साथ ही बिजली की नीली चिनगारियाँ भी दिखलाई देती हैं। यह बड़ी ही विचित्र घात है कि सारे जातवरों में से कुछ भिन्न-भिन्न मछलियाँ ही ऐसी हैं, जिन्होंने अपनी आवश्यकता के लिये बिजली की शक्ति को जीत लिया है और वे अनेकानेक प्रकार से उसका प्रयोग करके लाभ उठाती हैं।

पूँछ में वैटी—

अमरीका की अमेज़न नदी की बिजलो बालो 'एल' मछली (जल-व्याल) लोच वंश की मछलियाँ में से हैं। उसकी जल-

विजली उत्पन्न करने वाली मछलियाँ]

ज्याल की-सी शक्ति बिलकुल दिखावटी होती है। इस मछली के शरीर का ४-५ भाग पूँछ होता है, अर्थात् अन्य अंगों के अनुपात से पूँछ बहुत बड़ी होती है। उसमें विजली की बैट्री के तीन समूह होते हैं। इस जाति की ६ फुट लम्बी एक मछली कई सौ बोल्ट की ताक़त से टक्कर मार सकती है। वह इस शक्ति को मुख्यतः अपने शिकार के मारने या अचेतन करने में प्रयोग करती है। देखा गया है कि इस मछली ने घोड़ों और आदिमियों को छुवो दिया है, क्योंकि उसने अपनी विजली की शक्ति से उन्हें औंधा करके पानी में गिरा दिया। यह मछली अपनी बैट्रीयों को सोटे तौर पर तारबक्की के रूप में भी प्रयोग करती है और इसी से अपनी जाति के अन्य लोगों को आपने आने की सूचना देती है। जैसे ही एक बार एक शिकार पर आघात हुआ नहीं कि वैसे ही आस-पास की समस्त दूसरी विजली वाली एल दरियाई साथी से विजली का संकेत मिल जाता है। इस मछली दूसरी लोगों की दो जातियाँ होती हैं; एक का रंग कुछ लाली लिये हुये भूरा होता है, और दूसरी का, जो अधिकतर पाई जाती है, कुछ कालिमा लिये हुये स्लेटी नीला होता है यानी सुरम्भ, और उसके सारे शरीर से एक अनधकारमय लालिमा फैला करती है।

अरब और नील नदी की विजली पैदा करने वाली 'कैटफिश' (विजली मछली) एक भारी अस्कम दो फुट या इससे कुछ अधिक लम्बी मछली होती है, जिसका रंग पीला होता है और उसमें भूरे रंग के धब्बे होते हैं। इसके ओठों पर आंथ्रित आठ लम्बे स्पर्शक होते हैं। यह बहुतायत से मिलती है, और अक्सर अरब लोग इसे खाते हैं और इसे 'रायदा' विजली मछली कहते हैं।

इसका सारा शरीर एक लिफाके की तरह, विजली के एक बड़े अंग से ढका रहता है। यद्यपि इसकी शक्ति विजली वाले जल-व्याल की अपेक्षा कम होती है, तो भी पर्याप्त अधिक होती है। विजली वाले जल-व्याल आपस में एक दूसरे के आघात से सुरक्षित रहते हैं। किन्तु विजली उत्पन्न करने वाली 'कैटफिश' एक स्थान में रहने वाली स्वजातीय सदस्यों को निश्चय ही मार डालती है।

गठिया के इलाज में प्रयोग—

विजली की किरन या टारपेडो नामक मछली सारे गरम समुद्रों में आमतौर पर पाई जाती है। उसका सारा शरीर घने रूप से एकत्रित विजली की बैट्रियों से आच्छादित रहता है, जिनका आकार छः पहलू होता है और वे इस प्रकार स्थित रहती हैं कि उनका एक सिरा पीठ को छूता है और दूसरा पेट को।

टारपीडो को अंगरेजी समुद्री किनारों के लोग सुन्न मछली और फ्रांस के लोग "मानशियरटचेज़" कहते हैं। यह 'प्रे-मुलेट' के सदृश्य कोमल मछलियों पर प्रहार करती है और उन्हें धीरेधीरे ऐसे घेर लेती है कि वे बचकर निकल नहीं पातीं। कई झटके देने के पश्चात् यह मछली पस्त हो जाती है और धृपनी बैट्रियों में फिर से विजली उत्पन्न करने के लिये उसे घन्टे दो घन्टे के समय की और पर्याप्त भोजन की भी आवश्यकता होती है।

प्राचीनकाल में इस मछली से गठिया के इलाज का काम लिया जाता था। रोगी को मछली के ऊपर उस समय तक खड़ा रहना पड़ता था जब तक के लिये चिकित्सक की आज्ञा होती थी या रोगी की सहनशक्ति आज्ञा देती थी।

यात्री-जीव

यात्रा करने के लिये जानवर कुप्रसिद्ध हैं। उनमें से लाखों प्रत्येक वर्ष कई यात्रायें करते हैं। इन यात्राओं में उन्हें हजारों मील चलना पड़ता है। लाखों ही जीव परजीवियों के रूप में यात्रा करते हैं किन्तु इनकी यात्रायें केवल घटनावश होती हैं। वे यात्रा करें चाहे न करें इससे उनका कोई तात्पर्य नहीं होता, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य तो भोजन प्राप्त करना होता है जो अनिच्छुक यजमान उन्हें सदा दे देता है। थोड़े से जीव यात्रा इसलिये करते हैं कि उन्हें सतत गति से ताजा भोजन प्राप्त होता है और उनकी समान भलाई के लिये यह आवश्यक है कि वे गतिशील रहें। इसका सबसे उत्तम उदाहरण कुत्ते होते हैं जो भोजन पा लेने पर भी काफी घूसते-फिरते हैं।

कछुओं को पकड़ने में प्रयोग—

जंगलों में अनेक जानवर ऐसे ही जीवन व्यतीत करते रहते हैं। उद्धण और अर्ध-उद्धण समुद्रों में पाई जाने वाली 'शार्क-सकर' (नाके को चूसने वाली) मछली एक अत्यन्त प्रसिद्ध उदाहरण है। इस मछली के सिर की चोटी पर एक बड़ी-सी पिछले सुकनों का परिवर्तित रूप होती है जो वास्तव में अणडाकार चूसने वाली टिकिया लगी रहती है जो वास्तव में भी साधारण चपटी चीज पर बड़े जोर से चिपक जाती है। इस प्रकार यह मछली जो तैरते में बड़ी सुस्त और काहिल होती है शार्कों, कछुओं और जहाजों के ढाँचों में चिपक कर स्वभावतः यात्रा करती रहती है। वह कुछ दैत्याकार मछलियों के मुँह के भीतर भी चिपक जाती है और इस प्रकार स्थापित होकर बजाय स्वयं ढूँढ़ कर शिकार करने के बहुत बहाँ बैठे-बैठे तरह-तरह के भोजन चुन-चुन कर खाया करती है।

प्राचीन समय से शार्क को चूसने वाली इस मछली का प्रयोग कछुए पकड़ने में किया जाता है। मछुए बहुत-सी शार्क चूसने वाली मछलियों को अपनी नाव के एक कोने में एकत्रित कर लेते हैं और प्रत्येक की पूँछ में एक लम्बी डोरी बाँध देते हैं। जैसे ही कोई कछुआ दिखलाई देता है, वैसे ही एक चूमने वाली मछली छोड़ दी जाती है और वह तुरन्त अपने शिकार की ओर चल देती है। जब वह शिकार पर निपक जाती है तब दोनों को खींच कर नाव पर रख लिया जाता है।

बच्चा सिपियों की सैर—

बच्चे और निराश्रय जानवरों की भलाई के लिये यात्रा आवश्यक हो सकती है और यह भिन्न-भिन्न प्रकार से निश्चित होती है। घन्द-गति से चेलने वाली अनेक नदियों, झीलों और तालाबों में ऐसी जेवरा सिपियों की एक बड़ी संख्या भिल सकती है जो खाने योग्य सिपियों से मिलतो-जुलतो हैं किन्तु उनमें सुन्दर धारियाँ होती हैं। जेवरा सिपियों के बच्चे, उत्पन्न होने के थोड़े ही समय के पश्चात् नदी की तह में बैठ जाते हैं और वहाँ मछलियों के किसी झुण्ड के आने तक पड़े रहते हैं। जब ऐसा होता है तब प्रत्येक बच्चा-सिपो बड़े जोर से अपने दोनों ढक्कनों को खोलतो और बन्द करती है। इस किया से ऊपर की ओर एक लम्बा और लसदार डोरा निकल आता है। यदि सब काम ठीक होता गया तो वहाँ से गुजरने वाली किसी मछली के वह डोरा चिपक जाता है, और बच्चा-सिपो डोरे के सहारे से चढ़कर उस मछली की खाल में घस जाती है और वहाँ उस समय तक ठहरती है जब तक बड़ी होकर इस योग्य नहीं हो जाती कि पुनः नदा में लौट जाकर अपना स्वतन्त्र जीवन आरम्भ करे।

बर्दों का शोषण—

बर्द के अनेक शत्रुओं में से एक खास गुबरीला होता है जिसके बच्चे जीवित ही नहीं रह सकते यदि वे अपने आरम्भिक जीवन में किसी तरक्की को एक बर्द की पीठ पर बैठ कर एक लम्जी ल्थाई यात्रा न करें। इस घटना को कार्यान्वित करने के लिये गुबरीले का बच्चा लकड़ी के किसी ऐसे खम्भे पर चढ़ जाता है जहाँ लकड़ी के गूदे की खोज में बर्दों के आने की सम्भावना होती है, क्योंकि लकड़ी के गूदे से बर्द अपना कागजी छत्ता बनाती हैं। गुबरीले का बच्चा उस समय तक अपनी पिछली दौँगों के सहारे से उस खम्भे पर लटका रहता है जब तक कोई बर्द उसकी पहुँच में नहीं आ जाती। बर्द के मिलते ही वह उसकी पीठ पर सबार होकर बर्द के छत्ते में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच कर वह बर्द के कीट-डिस्ट्रक्ट को समाप्त कर देता है और अन्ततोगत्वा एक कीट-कोष से धुस कर उस समय तक रहता है जब तक पूरा गुबरीला बनकर बाहर नहीं निकलता। इसके अस्ताने बर्द का शोषण किर से आरम्भ होता है।

प्राणी-राज्य के सुरंग बनाने वाले जीव

हमारे सामाजिक जीवन में सुरंगों का महत्व दिन परिदिन बढ़ता जाता है। सुरंग स्थान बचाने का एक सुगम उपाय है। रेलों और मोटरों के गोदाम अधिकाधिक जमीन के नीचे बनने जाएंगे हैं। प्रायः सड़कें नीचे जाकर पार की जाती हैं और आज-कल हवाई आक्रमणों से बचने के लिये घरती के भीतर ही शरण मिलती है।

खोदने वाले कीड़े—

सबसे प्रथम कीड़ों ही ने सुरंगें बनाने का काम आरम्भ किया था। खोदाई करने का उनका काम केवल उन्हीं की रक्षा के लिये अनिवार्य नहीं है किन्तु वनस्पतियों की शक्ति और जीवन के लिये भी आवश्यक है और वनस्पतियों के लिये लाभदायक होने के कारण अन्य जानवरों के जीवन के लिये भी उपयोगी होता है। नली के आकार के छोटे-छोटे कीड़े जो सामान्यतः समस्त ताल-तलैयों में पाये जाते हैं, अपने आध इच्छ लम्बे शरीर से चौबीस घन्टे में नौ गज मिट्टी निकाल फेंकते हैं। इसी प्रकार केंचुआ भी सुरंग बनाता है। वह अपने शरीर में एक ओर से मिट्टी को प्रवेश करता है, अर्थात् जो कुछ मिलता जाता है उसे निगलता जाता है और दूसरे सिरे से निःसार को बाहर निकालता जाता है। किसी बारा की एक एकड़ भूमि की नीचे की पत्न्द्रह टन मिट्टी को निगल कर कीड़े उसे प्रति वर्ष ऊपर के तल पर ले आते हैं।

कीड़ों के सदृश्य ही सुरंग खोदने वाले समस्त जीवों का शरीर लम्बा ही होता है चाहे वे शिकारी कुत्ते, नेवले की जाति वाले जीव, छछूँदर, छछूँदरी, भींगुर, घोंघे या लम्बो टाँगों वाले बोए हों। सुरंगें बनाने के ढंगों में बड़ा अन्तर होता है। खोदने के काम से सारे स्तनपायी अपने अगले पैरों का प्रयोग करते हैं और पिछले पैरों से खोदी हुई सामग्री को हटाकर दूर फेंकने का काम लिया जाता है। इस प्रकार अफ्रीका का चींटी-रीछ सुरंग खोदने में फावड़ा, गैती लेकर काम करने वाले दो आदमियों से आगे बढ़ जाता है।

श्रान्ति-राज्य के सुरंग बनाने वाले जीव]

संसार का कुरुपतम स्तनपायी—

सुरंग खोदने से किसी जानवर की टाँगें और सामान्य आकार ही प्रभावित नहीं होते बल्कि उसकी बाहरी त्वचा पर भी असर यड़ता है। जैसे छब्बूदर के रोएँ इतने छोटे और घने होते हैं कि उन पर अधिक देर तक कोई कूड़ा, मिट्टी चिपकी हुई रह नहीं सकती। 'आरसाडिल्से' के समान कुछ सुरंग बनाने वालों ने ऐसी कड़ी खाल उन्नत कर ली है और उसमें एक के ऊपर दूसरी ऐसी पत्तरें बढ़ गई हैं कि उन पर से पानी ऐसे किसल जाता है जैसे कि खपरेल वाली छत से। अफ्रीका की मरुभूमि का चूहा एक ऐसा जीव है जिसने तप्त सूर्य के नीचे गरम रेत में सुरंग बनाते-बनाते, अपने सारे बाल गिरा दिए हैं और दरियाई गेंडे के समान एकदम निहंग हो गया है। कदाचित् वह सारी पृथ्वी के जानवरों में सबसे अधिक कुरुप होता है।

सीसे में छेद करने वाली बर्द—

मिट्टी के अतिरिक्त दूसरे अनेक पदार्थ होते हैं जिन पर प्रकृति के विशेषज्ञ खोदाई करने वाले विजय प्राप्त करते हैं। बहुत से धुन, गुबरीले और बड़े-बड़े फिनगे लकड़ी में वैसे ही सुरंग कर देते हैं जैसे कि कीड़े मिट्टी में। वे अपने मल के रूप में केवल निःसार वस्तुओं ही को नहीं निकाल फेंकते किन्तु लकड़ी के धुरादे के छोटे-मोटे ढेर निकाल बाहर करते हैं। एक धुन तीन इच्छ मोटी चमड़े की जिल्द बँधी हुई पुस्तक के आर-पार नलीदार सुरंग बना लेते हुये देखा गया है। लकड़ी में छेद करने वाली बर्द मोटे सीसे की चदर से मढ़े हुये सनोवर की लकड़ी के कुन्दे में छेद करके धुस जायगी।

घोंघों की एक जाति होती है जो लकड़ी, स्लेट के समान एक मुलायम पत्थर और कठोरतम चूने के पत्थर में लम्बी-चौड़ी

सुरंगें बना लेती है। ये सुरंग खोदने वाले अपने मज्जबूत पैरों के सहारे से अपनी सिप्पी को हिलाते हैं और सिप्पी की पनालियाँ छेनी का काम करती हैं। इस रीति से कंबल चूने के पत्थर ही नहीं किन्तु मँगे की चट्टाने तक तोड़ डाली जाती हैं। पथरीले किनारे निरन्तर गिरते-बनते रहते हैं। सुरंग करने वाले ये समुद्री जीव हमारा लाखों रुपये का नुकसान करते हैं, ठीक उसी तरह से जैदे लकड़ी खाने वाले कीड़े करते हैं।

जानवर सोते कैसे हैं ?

नींद की परिभाषा करना एक खरल-सी बात मालूम देती है। वास्तव में वह मात्रा या अंश की बात है, और जो स्थिति एक के लिये जाग्रतावस्था है वही दूसरे के लिये घोर निद्रा हो सकती है। जितना ही बड़ा और उच्चतर मस्तिष्क होगा उतना ही कम उसे पूर्ण विश्राम का ज्ञान होगा। मस्तिष्क में सतत उतार-चढ़ाव होते रहना ही निद्रा है, इसी से त्वप्रों की व्याख्या भी होती है, जो हम में और कुत्ते-बिल्ली के समान जानवरों में प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। मस्तिष्क का कुछ देव्र सदृश कार्य करता रहता है; साधारण स्वास्थ्य में उसका सम्मत भाग कभी भी निष्क्रिय नहीं होता।

लीमर बन्दर को रात्रि की आवश्यकता नहीं होती—

एक पुरानी कहावत है कि “छै घन्टे की नींद पुरुषों के लिये सात घन्टे की खीं के लिये और आठ घन्टे की मूर्ख के लिये, होती है।” किन्तु वर्तमान ज्ञान के प्रकाश में उपर्युक्त कहावत अर्थ नहीं रहा। उत्तमतम बुद्धि वाले कुछ लोगों को

जानवर सोते कैसे हैं ?]

सोने के लिये चौबीस घन्टे में केवल पाँच घन्टे पर्याप्त होते हैं, कुछ को आठ या नौ घन्टे और कुछ औसत लोगों को इससे भी अधिक ।

मस्तिष्क-शक्ति में यद्यपि पशुओं की तुलना मनुष्य से नहीं की जा सकती, तो भी पशुओं में विश्राम की आवश्यकता बड़ी विभिन्नता के साथ प्रकट होती है । बनमानुष और बन्दर बहुत कुछ हमारे ही सदृश्य दिखलाई देते हैं, क्योंकि ये हमारे ही अनुसार समय का प्रयोग करते हैं । दिन का प्रकाश होते ही वे सक्रिय हो जाते हैं और संध्या का अन्धकार होते ही उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव होने लगती है । हमारे रात के पहुँचों या चौकीदारों और बाजार में काम करने वालों के समान कुछ लीमर बन्दरों ने प्राकृतिक व्यवस्था को उलट दिया है, किन्तु तो भी उन्हें प्रत्येक चौबीस घन्टों में उतने ही घन्टे सोने की आवश्यकता होती है ।

देहातों में रहने वाले घुमक्कड़ जानवरों ने अपने विश्राम के समय को बहुत कम व्यवस्थित किया है । गर्भी की ऋतु में एक खुले खेत रहने वाली एक गाय अपने शत्रुओं से सुरक्षित होने पर भी अपने पैतृक लक्षणों को पार नहीं कर पाती, अर्थात् वह प्राचीनकाल की उस स्मृति को नहीं सुला पाती जब प्रत्येक ग्रास खाते समय इस बात की ओर चौकसी की झटि रखी जाती थी कि कोई आने वाला खतरा तो नहीं सम्भव है ।

चरने वाले अधिकतर स्तनपायी थोड़े-थोड़े अन्तर से खाते और सोते रहते हैं; प्रकाश और अन्धकार उनके काम करने और सोने के समय को निर्धारित करने के लिये आवश्यक नहीं होते । हाथी चार घन्टों से अधिक समय वास्तविक निरा में व्यतीत करते हुये बहुत कम देखे जाते हैं यद्यपि वे अपने विचित्र ढंग

से “विश्राम” करते हुये एक ही स्थान पर उससे दूने समय तक बने रह सकते हैं। वे अपने विश्राम में निरन्तर पैर हटाते रहते हैं और ताल-सुर में भूमा करते हैं।

क्या ह्लैल मछली सोती है ?

इस प्रश्न का उत्तर देना असम्भव है, क्योंकि ह्लैल के घन्टों पानी की सतह पर रहने पर भी निश्चयात्मक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि वह वास्तव में सोई हुई है या नहीं ? निरीक्षण करके लोगों ने पता लगाया है कि उसका जल में धूमना कभी भी बन्द नहीं होता और वह बिना रुके तैरती रहती है किन्तु रात्रि को उसकी चाल कुछ धीमी अवश्य हो जाती है।

सम्भवतः एक ह्लैल विश्राम के समय में भी एक यंत्र की तरह वैसे ही तैरती रहती है जैसे कि युद्धकाल में मार्च करते हुए कुछ सिपाही सोते हुए चले जाते हैं। मालूम हुआ है कि कुछ मछलियाँ सोती हैं। उनको वे जातियाँ जो पानी के ऊपरी तल पर रहा करती हैं रात को गहराई में चली जा सकती हैं और बिलकुल नीचे वाली ऊपर आ सकती हैं। ‘वारासे’ सचमुच कुत्ते की तरह करबट के बल लेटती है, और बहुत-सी दूसरी सामान्य मछलियाँ चट्टानों, जलीय पौधों आदि से सट जाती हैं। मुलेट मछलियाँ साधारणतयः बड़े झुण्डों में तैरती हैं। रात को झुण्ड छिन्न-भिन्न हो जाता है और प्रत्येक मछली भिन्न-भिन्न और चल देती है और सब शान्त हो जाती हैं। प्रकाश उन्हें तुरन्त इकट्ठा कर देता है और वे फिर गतिशील हो जाती हैं।

जाड़े की निद्रा—

जंगली चूहे और ‘डारमौस’ नामक गिलहरी के समान एक जानवर की जाड़े की नींद प्रसिद्ध है। इनकी निद्रा में

इनका तापमान उससे बहुत गिर जाता है जो प्रायः निद्रा में गिरा करता है। कुछ पक्षियों को भी सोते में ऐसी ही सृत्यु की-सी भूर्छा आ जाती है। जाड़े की ऋतु में भव्र-भव्र करने वाली चिड़ियाँ ऐसी गहरो नींद में सोती हैं कि उन्हें उनके अड्डे से उठाने में उनके एक-एक पंजे को अलग-अलग छुटाना पड़ता है।

आद्ट्रैलिया का 'फ्राग-माडथ' या 'सोरपोक' उल्लू ऐसी घोर निद्रा में सोता है कि उसके पास ही पड़े हुए उसके साथी के गोली से मारे जाने पर भी वह अपने को जगाने में असमर्थ होता है। इस पक्षी को बगैर जगाये हुये पेड़ की शाखा से उठा कर थैले में रख लिया जा सकता है।

पक्षी-जगत में बुनकर

प्रकृति ने मशीनों की बनी हुई हमारी अनेक अटपट आवश्यक वस्तुओं को पहिले ही से सोच लिया था। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि आदिम मनुष्य ने निम्नकोटि के पशुओं के अधूरे आरम्भ का अध्ययन करके इन वस्तुओं के सम्बन्ध में अपना प्रथम विचार धारण किया हो। उदाहरणार्थ बुनने की क्रिया बहुत ही प्राचीन है और वह मनुष्य का आविर्भाव होने के बहुत पहिले की है।

चिड़ियाँ फैशन को प्रारम्भ करती हैं—

संसार के दो ओर रहने वाली चिड़ियों की दो जातियाँ अर्थात् अमेरिका की घोंसला लटकाने वाली और प्राच्य देशों की

बुनने वाली, अब तक बुनने का व्यवहार जारी किये हुये हैं और उन्होंने पर्याप्त पूर्णता सी प्राप्त कर ली है। ये छोटी चिड़ियाँ, जो सारिकाओं या तूतियों से अधिक बड़ी नहीं होतीं, अपने बड़े-बड़े सामूहिक घोंसले बनाने में सूखी घास का प्रयोग करती हैं और प्रायः उन्हें पेड़ों की शाखाओं से लटका देती हैं ताकि सौंप, बन्दर और अन्य लुटेरे उन तक पहुँच न सकें।

अमेरिका में इन चिड़ियों के लिये लोग विशेष स्थान निश्चित करके रँगा हुआ उन रख देते हैं, जिसका परिणाम बड़ा आश्र्य-जनक होता है। चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाने में इस रँगे हुये उन का प्रयोग करती हैं। वे नीले रंग को अधिक पसन्द करती हैं। ये चिड़ियाँ फैशन का आरम्भ कर देती हैं और कुछ काल के पश्चात् लोग उसकी नक़ल करते हैं। चिड़ियों के इस प्रकार से सजे हुये उपनिवेश का दृश्य ऐसा होता है मानों पेड़ों पर इन्द्र धनुष के रंग से रँगे हुये बड़े-बड़े फल उत्पन्न हुए हैं।

दर्जी चिड़ियाँ पत्तियों को सीती हैं—

भारतीय दर्जी चिड़ियाँ, जो गाने वाली चिड़ियों की एक जाति हैं, बुनने की कला को एक पग और आगे बढ़ाती हैं। वह केवल बिना क्रम के बलों और भाँजों से संतुष्ट नहीं होतीं, किन्तु घास की प्रयोग करके लटकती हुई पत्तियों को ऐसे सी देती हैं मानों किसी ने एक फीते के दो झुमकों को इकट्ठा कर दिया हो। इस प्रकार बने हुये कटोरे के बीच में घास से बुना हुआ घोंसला स्थिति रहता है।

कुछ भक्षणीय चिड़ियों के घोंसलों की रचना में भी थोड़ी बहुत बुनावट होती है। चीन की अबाबीले अपने घोंसले ऊँची चट्टानों पर बनाती हैं। वे अपने घोंसलों की घास और बालों आदि को चिपकाने में एक लसदार तार का प्रयोग करती हैं।

पक्षी जगत में बुनकर]

मुँह बन्द करने में रेशम का प्रयोग—

रेशम, रेशम के कीड़ों का ही एकाधिकार नहीं है। अनेक पतिंगे, तितलियाँ और असंख्य दूसरे कीड़े उन कीटकोषों को बनाने में रेशम का प्रयोग करते हैं, जिनमें उन्हें घुन अवस्था से पर निकलने से पूर्व की अवस्था में और उसके पश्चात् पूर्ण कीट बनने में आश्रय मिलता है। केंदिस कीड़ा जो मछली पकड़ने में चारे की तरह प्रयोग किया जाता है, केंदिस-मक्खी बन कर निकलने के पहिले अपने पत्थर या लकड़ी से बने हुए “सन्दूक” के मुँह को इसी प्रकार बन्द कर देता है।

ये रेशम बहुधा बड़े चिपचिपे होते हैं। “उण्णा” क्लों की चींटियों की एक नसल ऐसे घुन या कोए उत्पन्न करती है जो सरेस के समान चिपकने वाले होते हैं। तरुण चींटिया पत्तियों से अपने घोंसले बनाती हैं और उन पत्तियों को सट कर जमाने के लिये अपने घुनों को जीवित टेकुओं की तरह प्रयोग करती हैं। चींटियाँ अपने को दो दलों में क्रम से स्थिर कर लेती हैं, एक दल दोनों पत्तियों को एक साथ खींचे रहता है और दूसरा दल जिसके प्रत्येक श्रमिक के जबड़ों में एक घुन होता है—किनारों को ऐसे जमाता है कि वे अलग-अलग न हो सकें।

मकड़ी के रेशम की ताँत—

मकड़ी का रेशम बुनकर जाल बनाये लाते हैं, वे या तो स्वीकृत नमूने के होते हैं या चोंगे के आकर के; जैसा कि खरेलू मकड़ी बनाती है। जलीय मकड़ी अपने रेशम का प्रयोग अपर्युक्त प्रकार से करती है और अँगुलि-त्राण (दर्जी की अँगुली में पहनने की टोपी) के आकार के ओंधे किए हुए अपने घोंसले में हवा भर देती है, तथा उसमें अपने अंडे रखती है। “सर्वोत्तम ताँत

स्तनपायी-मूलक नहीं होती किन्तु मकड़ी के रेशम से उस समय प्राप्त होती है जब कि बड़ी मकड़ियाँ उसे अर्ध-द्रव रूप में उत्पन्न करती हैं। इसके पश्चात् उसे आवश्यक लम्बाई तक खोंचा जा सकता है।

घोंघों द्वारा बुनने में प्रयोग किया हुआ रेशम भी काफ़ी मजबूत होता है। इसके सहारे से वे अपने आपको चट्टानों में लटका लेते हैं। भयंकर तूफ़ानों को छोड़ कर वह शेष सभी अवस्थाओं को सहन करने के लिये यह पर्याप्त मजबूत होता है। भक्षणीय घोंघों को ताजा खोलने पर सदा इस रेशम का एक गुच्छा मिल सकता है। वह निर्देष होता है, और कुछ लोगों की धारणा के अनुसार विषेश कूड़ा-करकट नहीं होता।

इंग्लिश चैनल के किनारे के कुछ घोंघों की सिपरी एक फुट या अधिक लम्बी होती है। इनके द्वारा कता हुआ रेशम घोड़ों की पँछ के समान होता है। इससे हाथ के दस्ताने और गले की नैकटाइयाँ बनाई जाती हैं, किन्तु इनकी मात्रा इतनी अधिक नहीं होती कि यह व्यापार का प्रश्न बन सकें।

जानवरों की उम्रे

तत्व या द्रव्य अक्षय है, और जीवित तत्व उपपन्न रूप से अमर है। यदि किसी युवा और स्वस्थ जानवर के शरीर से कोषों की कृत्रिम उत्पत्ति उन कोषों को किसी पोषक माध्यम में रखकर की जाती है, तो कोषों का विभाजन उपस्थित हो जाता है। और यदि कुछ सेमय के पश्चात् नवीन वृद्धि से एक दूसरी की जाती है और यह क्रम आगे चलता रहता है, तो

जानवरों की उम्रें]

जानवर के मर जाने के बहुत काल पश्चात् तक मूल जानवर का एक भाग लगभग असीम काल तक चला जा सकता है।

किन्तु जहाँ तक हम जानते हैं घटना यह होती है कि कोई जीव अपने आप सदा जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि किसी जीवित रचना के सहारे कोष क्षय हो जायें, किन्तु आगे-पीछे, उक्त पेचीली रचना का एक भाग शिथल पड़ जाता है, और सारी रचना अस्त-व्यस्त हो जाती है और परिणाम होता है मृत्यु। तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक जीवधारी अनजाने ही आत्महत्या करता है।

उम्रें जानने के ढंग—

अब तक लोग घोड़े और वैलों के दाँत, कछुओं की ढाल और मछलियों की हड्डियाँ देखकर उनकी उम्रें जाना करते थे। और मछलियों की हड्डियाँ देखकर उनकी उम्रें जाना करते थे। किन्तु पिछले पचास वर्षों में जीवन की आयु का विस्तार जानने पर गम्भीरता से ध्यान दिया गया है। चिड़ियाघरों, बाग-बगीचों, खेतों, मछलीघरों आदि समस्त स्थानों से जानवरों के जीवन-विस्तार के अंक एकत्रित किये गये हैं, और क्रम से लिखे गये हैं। अनेक ध्यान आकर्षित करने वाले तथ्य प्रकाश में आ गये हैं और प्राचीन प्रतिष्ठित भ्रम दूर हो गये हैं।

पहली बात तो यह है कि जंगली जानवरों की जीवन-सीमाएँ अनुमानित ही रहेंगी, और बन्धन में रखे हुए जानवरों से प्राप्त अंक साधारण सीमाओं से सम्भवतः बढ़ जाते हैं। मनुष्य की देख-भाल में पाला हुआ जानवर अपने शत्रुओं, बीमारियों और जंगल की सारी आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षित रहता है।

शारीरिक क्षीणता—

कितने दिनों तक शरीर ल्पीयंत्र, चाहे वह किसी पौधे का हो या जानवर का, चलेगा यह बहुत कुछ निर्भर करता है उसकी विसन और टूट-फूट पर। एक छोटे शरीर की अपेक्षा एक बड़े शरीर के विसन में अधिक समय लगता है। इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि जो जानवर जितना बड़ा होता है उसनी ही उसकी उम्र ज्यादा होती है। किन्तु ऐसा कोई जानवर नहीं जाना गया है जो दैत्याकार सेक्यूरिया वृक्ष से अधिक जीवित रहा हो। यह वृक्ष बीस शताब्दियों को भी पार कर जाता है। इसके विरुद्ध एक समुद्री पुष्प के शक्य या उपपन्न जीवन-विस्तार की सीमा कोई नहीं बाँध सकता। नेलसन परिवार में सौ वर्ष से भी अधिक समय से रहते हुये एक समुद्री फूल के आकार और शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं दिखलाई देता।

एक समुद्री फूल शान्तिमय जीवन व्यतीत करता है और उसका कोई शब्द नहीं होता। किन्तु इसके विपरीत एक झोंगा को सदा कोई न कोई खतरा बना ही रहता है। मिलपोर्ट के मछलीघर में पाला हुआ एक दैत्याकार केकड़ा चौवालिस वर्ष का पुराना हो गया है और अब उसमें बुढ़ापे के चिन्ह प्रकट होने लगे हैं। स्वयं उपस्थित होने वाले सारे खतरों के अतिरिक्त एक केकड़ा अपनी बहुत-सी शक्ति नियमित समय पर अपनी सिप्पी बदल-बदल कर क्षीण कर देता है, और इस घटना से कभी-कभी इस छिलकेदार मछली को अपना जीवन भी उत्सर्ग करना पड़ता है।

हाथी चालीस वर्ष में बुढ़ा हो जाता है—

जो पशु-पक्षी या अन्य जानवर बन्धन में रखे जाते हैं उन्हीं के सम्बन्ध में विश्वसनीय प्रमाण मिल सकते हैं। बहुधा कहा जाता है कि हेल मछली की आयु हाथी से अधिक होती है, किन्तु इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं है और इसमें शंका भी मालूम देती है, क्योंकि कोई हाथी या हथनी बीस वर्ष के पहले ऐपितृत्व या मातृत्व नहीं प्राप्त करती, किन्तु एक हेल ढाई वर्ष में पिता या माता बन जाती है। यह एक साना हुआ सिद्धान्त है कि जो जीव जितनी जलदी युवा अवस्था प्राप्त करता है उतनी ही उसकी आयु कम होती है।

तथाकथित लन्दे जीवन का दूसरा जानवर गधा है, किन्तु वह बहुत ही कम पच्छीस वर्ष के पार पहुँचता है। बन्धन में पहले हुये बाघ बहुधा चालीस वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। वह आयु जावारण काम करने वाले एक घोड़े से अधिक होती है, और घरेजू विलियों से तिगुनी। घड़े कँगाल छोटी जाति बालों से दूने दिनों तक जीवित रहते हैं। मालू-रीछ की उम्र 'घैजर' (अर्थात् रीछ के समान एक चौपाया) और 'फेरेट' (तेवले की जाति का एक जानवर) से दूनी होती है। किन्तु कुत्तों का विपार करते समय हमारे इस सिद्धान्त पर बड़ा धक्का लगता है कि जो जानवर शरीर में जितना ही बड़ा होगा वह उतने ही अधिक काल तक जीवित रहेगा। कुत्तों की जातियों में एक बड़ा हेतु और पेशीनीज लगभग बराबर उम्र तक जीवन का लुभ आगते हैं।

दूध देने वाले जानवरों की उम्र की सूची इस प्रकार है—

जानवर	उम्र साल	जानवर	उम्र साल
खरगोश	५—१०	गाय	२५—३०
चूहा	६	जेत्रा	२५—३०
गिरीषिग	६—७	गधा	२५—३०
गिलहरी	६—१५	घोड़ा	२५—४०
बिल्ली	९—१०	चीता	२५—३५
बिल्लू	१२	रीछ	२५—३५
लोमड़ी	१४	चिम्पेंजी	३१
गोदड़	१४	दरियाई घोड़ा	३५
कुत्ता	१०—१५ (कभी ३० तक)	बन्दर	३०
चरख़	१४	गैंडा	३७
चिमगाड़	१५	जिराफ़	१९
भेड़, बकरी	१५	हाथी	१००
लामा	१७	हिरन	२०

पक्षी-जगत की आयु—

गिढ़, गरुड़ और उल्लू वहुतेरे अन्य पक्षियों की अपेक्षा अधिक जीते हैं। पालतू गिढ़ आम तौर से चालीस वर्ष से अधिक दिनों तक जीवित देखे गये हैं और सत्तर वर्ष के एक गरुड़ का भी उल्लेख मिलता है। परों का ह्रास और चोंच को अति-बृद्धि को तोतों की बड़ी आयु का प्रमाण माना जाता है किन्तु वास्तव में ये दोनों वातें अस्वस्थ्य और उपेक्षा से रखे जाने की दोतक हैं।

अलीगढ़ के विश्वविद्यालय के अध्यापक मिस्टर अब्दुल वशीर खँ ने अपनी पुस्तक “हैवानी दुनियाँ के अजायबात” में

एक दूसरे की पुष्टि करती हुई पाई जाती हैं। सौ वर्ष की पुरानी कही जाने वाली मीठे पानी की मछली जाँच करने पर कदाचित् ही तीस वर्ष से ऊपर की निकलती है। सम्भवतः इन मछलियों पर जम जाने वाला कुकुरमुत्ता बहुधा उनकी अधिक आयु का भ्रम उत्पन्न करता है, और इसीसे उनकी भूठी प्रसिद्धि हो जाती है। लंडन के चिड़ियाघर की दैत्याकार बिल्ली-मछली साठ वर्ष से ऊपर की और 'स्टरालिट' छियालिस वर्ष की पुरानी मौजूद है। अब तक इतनी ही बड़ी मछलियों का पता चला है। 'रॉस-शायर' का एक जल-व्याल वहाँ के एक तालाब को ४० वर्ष से मुशोभित कर रहा है। धोंधों के सम्बन्ध में प्रायः यह देखा गया है कि उनके किनारों से यह पता चल जाता है कि उनकी वृद्धि चालू वर्ष के लिए कब रुक गई, जाड़ा प्रायः अपेक्षाकृत उनके अचल रहने का समय होता है। औसत कस्तूरा-मछली जो खाई जाती है चार वर्ष से अधिक आयु की नहीं होती।

छोटे-बड़े जानवरों की अनुमानित उम्रें—

सबसे छोटे जानवर जैसे प्रटोजोआ और वेक्टेरिया आदि का आयुकाल इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे सोच ही नहीं सकते। इनका प्रत्येक व्यक्ति अपने जैसे असंख्य जीव एक घण्टे में उत्पन्न कर सकता है। इनकी स्वाभाविक मृत्यु कभी नहीं होती। ये विभाजित होकर बढ़ते रहते हैं। इसीलिये इनकी मृत्यु का समय निश्चित नहीं किया जा सकता और इनकी कोई लाश भी नहीं मिलती। इनकी मृत्यु प्रतिकूल परिस्थितियों में फँस जाने पर होती है जैसे गरम पानी आदि। अतः उनके जीवनकाल के सम्बन्ध में कुछ कहा नहीं जा सकता।

अन्य कीड़े-मक्कोड़ों का जीवनकाल इस प्रकार है :—

पानी का सज्जा, केंचुआ, सितारा मछली, समुद्री-साही, खन्खजूरा आदि की आयु १ साल की होती है, किन्तु केंकड़ा ९ साल और झोंगा मछली २० साल तक जीवित रह सकती है।

जो कीड़े १ फुट से अधिक लम्बे होते हैं वे कई साल तक जीवित रहते हैं।

गुलाम चीटियों की रानी १३ वर्ष तक, दीमक छीरानी ४ वर्ष तक, और मधु-मक्खी की रानी ३ वर्ष तक जीवित रहती हैं। चीटी श्रमिक कुछ सप्ताह में, मधु-मक्खी श्रमिक एक साल में और उनके नर ४ मास में मर जाते हैं। बर्दों की मादा की आयु २ साल और नर की ३ मास होती है।

तितिलियों के जीवन का अधिक भाग उनको कीट-डिम्ब और इल्ली अवस्था में बीत जाता है और वे अपनी पूर्णावस्था में केवल कुछ ही दिनों की मेहमान रहती हैं। इस प्रकार उनके जीवन का समस्त काल लगभग एक साल तक पहुँच जाता है। घरेलू मक्खी लगभग ३४ दिन तक जीवित रहती है। किन्तु चारपाई का खटमल बिना भोजन के ६ साल तक जीवित रह सकता है। मकड़ी प्रायः पहिले ही जाड़े में मर जाती है और यदि जाड़ा पार कर गई तो दो-तीन साल तक जीवित रह सकती है।

प्रायः यह देखा गया है कि इडोदार जानवरों का जीवन वर्षास लम्बा होता है। भिन्न-भिन्न प्रकार की मछलियों की आयु भिन्न-भिन्न होती है। शार्क और सालमन मछली सौ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है किन्तु अन्य मछलियाँ इससे कम समय तक जीवित रहती हैं। एत की उम्र ६० साल होती है।

पानी का मेंढक ६ वर्ष से लेकर १२ वर्ष तक जीवित रहता है किन्तु जमीन पर रहने वाला मेंढक ३६ साल तक जीवित पाया गया है।

मछलीघरों में पाले हुये घड़ियाल ४० वर्ष तक जिन्दा रहते हैं और अनुभवी लोगों का ख्याल है कि साँप और छिपकलियाँ भी इतने ही समय तक जीवित रह सकती हैं। बड़ा कछुआ १०० वर्ष तक जीवित रहता है और गिरगिट की आयु केवल ४ साल की होती है।

नाड़ी की गति और आयु का परस्पर सम्बन्ध--

नाड़ी की चाल और जानवर की उम्र में एक विशेष सम्बन्ध होता है। जानवर की नाड़ी जितनी तेज होती है उतनी ही उसकी उम्र कम होती है, जैसे खरगोश, गिलहरी और चूहे आदि जानवरों की नाड़ी की चाल ३०० से ५२० तक प्रति मिनट होती है। ये कम उम्र के होते हैं। इनकी आयु अधिक से अधिक ५ वर्ष से १० वर्ष के बीच में होती है।

बिल्ली और कुत्तों की नाड़ी की चाल कम है अतः उनकी आयु अधिक होती है। आदमी की नाड़ी की चाल और भी कम होती है अतएव उसकी उम्र और भी ज्यादह होती है। प्रायः खियाँ पुरुषों से कम आयु प्राप्त करती हैं और इसीलिये उनकी नाड़ी की चाल पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। पुरुषों की नाड़ी की गति ६० से ७० तक होती है और खियों की ६५ से ८० तक। एक सीमा तक यही नियम चिड़ियों पर लागू होता है। जल-जीव भी इसी नियम के आधीन होते हैं जैसे मगर और नाके १०० वर्ष तक जीवित रह सकते हैं अतः उनकी नाड़ी की गति भी कम अर्थात् २२ से ४७ प्रति मिनट होती है।

जानवरों की चाल]

इसलिये यह सिद्ध होता है कि जानवरों आयु की सीमा का ओड़ा-बहुत अन्दाज़ हम उनकी नाड़ी की चाल से आसानी से लगा सकते हैं।

जानवरों की चाल

अब से पहले लोगों को घोड़े और कुत्ते आदि दौड़ाये जाने वाले पशुओं और सन्देश-वाहक कबूतरों ही की चाल का पता था किन्तु अब अन्य जानवरों को चाल भी खोज निकालो गई है और वह प्रति घण्टा इस प्रकार है :—

चीता ६० मील; घोड़ा ४८ मील; खरगोश ४५ मील; हिरन ४० मील; ताजी कुत्ता ३८ मील, जिराफ़ ६५ मील; हिपोपोटेमस (अफ्रीका का भैंसा) ३५ मील; शुतुर्मुर्ग ३५ मील; हाथी २५ मील; गैंडा २५ मील; आदमी १८ मील।

चिड़ियों की उड़ान—

अधिकांश चिड़ियाँ प्रति घण्टे ३० से ५० मील तक उड़ती हैं। सबसे तेज़ उड़ने वाले पक्षी २०० मील प्रति घण्टे उड़ते हैं। कबूतर प्रति घन्टे ३० से लेकर ३६ मील तक, सारस २३ से २८ मील तक, गौरैया २२ से २५ मील तक, काग २४ मील और मैना ३८ से ४९ मील तक उड़ती हैं। दूर जाते समय पक्षी प्रायः ३००० फीट की ऊँचाई पर उड़ते हैं। कोई-कोई पक्षी कभी-कभी ५००० फीट से अधिक ऊँचाई पर भी उड़ते हैं। ४००० फीट से लेकर ५००० फीट तक की ऊँचाई पर उड़ते हुए भी अक्सर पक्षी देखे गये हैं। एक सारस ६१७५ फीट की ऊँचाई पर उड़ता हुआ उड़ाया गया है। चीलें १७५० फीट की ऊँचाई पर उड़ती हुई पांच

जाती है ! कोई-कोई कौआ १०००० फीट की ऊँचाई पर भी उड़ता हुआ पाया जाता है ।

चिड़ियों की चाल—

चिड़ियाँ अपनी तेज़ चाल के लिए प्रसिद्ध हैं और उनमें से कुछ, जैसे कबूतर अपने घर को भी नहीं भूलते । उनकी चाल इस प्रकार है :—

शाहबाज—१८० मील प्रति घण्टा

गरुड़ या उड़ाव—११० मील „

बाज—६५ मील „

शिकरा कौआ—४५ मील „

अबाबील—३० मील „

मछलियों की चाल के सम्बन्ध में भी काफी खोज-धीन हुई है । परन्तु वे चिड़ियों से अधिक तेज़ नहीं चलतीं ।

अँधेरे में रहने वाले जीव

अँधेरे में जीवन व्यतीत करने वाले जानवरों का ध्यान आते ही हमें उल्लू, चिमगादड़ और छछूँदर की याद आ जाती है । किन्तु इनके अतिरिक्त बहुत से रात को शिकार करने वाले जानवर भी हैं जो दिन के प्रकाश में निकलना पसन्द नहीं करते । परन्तु रात के अँधेरे में अपना पेट भरने के लिये शिकार की खोज में अपने घरों से बाहर निकलते हैं । यद्यपि ये जानवर अँधेरे को पसन्द करते हैं तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि वे हमेशा अँधेरे ही में अपना समय व्यतीत करते हैं । बहुधा के दिन के उजाले में भी दिखलाई दे जाते हैं ।

ज्ञानीन के नीचे गढ़ों और बिलों में रहने वाले कीड़े-मकोड़ों की संख्या बहुत बड़ी है। किन्तु ये जानवर प्रायः अन्धे होते हैं क्योंकि उनकी आँखें अधिक दिन तक प्रयोग में न आने के कारण काम नहीं दे सकतीं और न उनको अँधेरे में उनको आवश्यकता पड़ती है किन्तु फिर भी उनमें से बहुतों की आँखें ठीक भी होती हैं। प्रकाश के अभाव के कारण ऐसे जानवरों के रंग गायब हो गए हैं और वे प्रायः सफेद या हल्के पोले रंग के होते हैं। इस अन्धकार में उन्हें भोजन भी कम मिलता है इसीलिये वे पर्याप्त छोटे हैं। आँखों की कमी को पूरा करने के लिये उनकी दूसरी इन्द्रियाँ काफ़ी उन्नति कर लेती हैं। यहाँ तक कि वायु की थोड़ी-सी गति से भी वे अपने शत्रुओं की उपस्थिति को पहचान लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं।

धरती के भीतर रहने वाले बहुत से जानवर अन्धे होने पर भी प्रकाश को अनुभव कर लेते हैं। अँधेरे में प्रकाश के पहुँचते ही कीड़े-मकोड़े और पर्तिगे भाग कर दराजों में छिपते हुए दिखलाई देते हैं।

वे क्या खाते हैं ? शायद फफूँद खाते हों, या मनुष्यों के बचे हुये टुकड़ों पर निर्बाह करते हों। खन्खजूरे जादि जानवर सड़ी हुई लकड़ी और फफूँद पर बसर करते हैं। बहुत से कीड़े अपने तथा दूसरे कीड़ों के बच्चों ही को अपना शिकार बना लेते हैं। इन जानवरों के मार्ग में जो छोटे जीव जाते हैं उन्हें वे चट्ठ कर जाते हैं और बलिष्ठ और बड़ी चीज़ से सामना हो जाने पर स्वयं उसका शिकार बन जाते हैं। ऐसी जगहों पर इस प्रकार एक दूसरे का पेट पलता है।

कुछ मछलियाँ भी अंधी होती हैं। इनमें से एक प्रकार की मछली की आँखें उसकी सिर की खोल के नीचे दबी होती हैं

और उनसे बिलकुल दिखाई नहीं देता। इनका रंग सफेदी लिये हुये होता है। इनके सिर के दोनों ओर कुछ अंग होते हैं जो किसी वस्तु के छू जाने पर उसे बाहरी परिस्थिति की सूचना देते हैं। और उन्हीं अंगों की सहायता से यह मछली अपना मार्ग भी मालूम कर लेती है। अँधेरे में रहने वाले अन्य जीवों की तरह यह मछली भी बड़ी डरपोक होती है तनिक सो आहट से वह तुरन्त गहरे पानी में भाग जाती है।

‘सैलैमैण्डर’ भी जमीन के भीतर रहने वाले जानवरों में से एक है। इसका शरीर लगभग १ फुट लम्बा और साँप के समान होता है किन्तु उसके चार पैर होते हैं। वह फुर्तीला नहीं होता किन्तु पानी के अन्दर पत्थरों में छिपा रहता है। उनकी गर्दन के दोनों ओर लाल रंग के गलफड़ होते हैं। इसका सारा शरीर सफेद होता है किन्तु यदि उसे प्रकाश में बाहर लाया जाता है तो उसका रंग बदलना प्रारम्भ हो जाता है और धीरे-धीरे वह बिलकुल काला हो जाता है। यह जानवर बिना किसी भोजन के बर्बाद जीवित रह सकता है।

साँपों में भी बहुत से इस प्रकार के होते हैं जो रात को शिकार करने बाहर निकलते हैं और दिन भर पत्थरों और अन्य जानवरों के बिलों में छिपे रहते हैं, किन्तु उनकी गणना धरतों के भीतर रहने वाली आबादी में नहीं की जा सकती क्योंकि ये बहुधा दिन को भी बाहर निकल आया करते हैं।

कुछ चिड़ियाँ भी अँधेरे में रहने वाली होती हैं। ऐसी एक चिड़िया दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों की खोह में रहने वाली ‘तितली चिड़िया’ है, जो सारा दिन अँधेरे में गुजारती है और केवल रात के अँधेरे में भोजन की खोज के लिये बाहर निकलती है और फलों पर निर्बाह करती है। यह पेड़ों पर बैठे बगैर उढ़ते-

बहुत ही अपने चौंक तो देखों के कुछ दोहे, जोनों ही और उल्लेख
परचात् बहुत ज़िंदाहै दक्ष उड़ जातो है। आजार में यह कौन्हे के
बाबर होती है और डस्को चौंक भी कौन्हे की कठह देहो दीती
है किन्तु इसका रंग भूरा होता है। इसके सैद्ध के दीनों और
कुछ कड़े बाल होते हैं, जिनके द्वारा यह कृष्णरंभ में जयना आयी
है तो तोही है। वहाँ के जंगली लोग इन विद्यों का लेल निका-
लते हैं और एक लम्बे बाँस से इनको मार लेते हैं। इसी ढर से ये
अपने घोंसलों को ऐसी जगह पर बनाती हैं जहाँ सबुजों का
आवागमन नहीं होता। प्रत्येक घोंसले में दो या चार अण्डे
होते हैं, आरम्भ में इनका रंग सफेद होता है किन्तु थोड़े समय
के पश्चात् मटीला हो जाता है।

ऐसे और भी जानवर हैं और कुछ स्वनपाठी भी हैं जो
अँधेरे या पथरों में अपना घर बना लेते हैं किन्तु भोजन छोड़ने
के लिए उनको भी बाहर आना पड़ता है।

जानवरों के रंग

झोटे से छोटे कीट, पतंगों में ध्यान से देखने पर भिन्न-भिन्न
प्रकार के रंग दिखलाई पड़ते हैं। इनमें से मुख के रंग बहुत
विचित्ताकर्षक होते हैं और कुछ अपनी विभिन्न अवस्थाओं में रंग
बदलते रहते हैं। अधिकतर कीढ़े-मकोड़ों के रंग उनकी इर्द-गिर्द
की परिस्थिति के अनुसार ही होते हैं और प्रायः उनके रंग जप्ता-
तरह पैदा होते हैं जैसे खनिज पदार्थों में।

काला रंग—

प्रायः यह देखा गया कि गहरे रंग और बदमिज्जाजी में एक विशेष अनुपात होता है। काले तेंदुये चीतों से अधिक भयंकर होते हैं। काले रंग के जानवर प्रायः अधिक नटखट होते हैं, जैसे काले बिच्छू और जंगली भैंसे, काले साँप, काले चूहे और काले बाहरसिंघे अपने अन्य रंग के साथियों की अपेक्षा अधिक खतरनाक होते हैं। काला रंग क्रोध का द्योतक है अतः यह न समझना चाहिये कि चमकीले रंग के बल मनमोहक और शोभा ही की वस्तु होते हैं।

जो बात गहरे और भड़कीले रंग वाले पशुओं की होती है वही दशा चमकीले और भड़कीले बाल और पर रखने वाले पक्षियों में भी पायी जाती है। वे हल्के और फीके रंग वाले अपने सजातीय पक्षियों की अपेक्षा अधिक लड़ाकू और बहादुर होते हैं। अन्य पक्षियों की अपेक्षा कौवा, कोयल और झुज़ंगा अधिक नटखट होते हैं। यही हाल पानी में रहने वाले काले मगरमच्छों का है।

भड़काने वाले रंग—

निरीक्षण से यह देखा गया है कि कुछ जानवर कुछ विशेष रंगों को देखकर भड़कते हैं और भयंकर हो जाते हैं। जैसे लाल रंग देखकर बैल भड़कता है और आक्रमण करने लगता है। चमकदार रंगों का काम दूसरों को धमकाना है। इसीलिये बहुत से जानवर चमकदार रंगों पर आक्रमण करते हैं जैसे लड़ते समय बुलबुले एक दूसरे की लाल पेटी को नोचती हैं।

लाल, पीला और हरा रंग—

स्तनपायियों में जिस प्रकार काला रंग क्रोध प्रकट करता है, वही हाल लाल रंग का भी है। लाल के पश्चात् पीले रंग का नस्बर आता है। मुर्गियों में नर लाल और मादा पीली होती है। जानवरों में हरा रंग सबसे निम्नकोटि का होता है। विशेषज्ञों ने उसका निरीक्षण चिह्नियों में करके यह परिणाम निकाला है कि उनके जन्म के प्रारम्भिक काल में उनका रंग हरा होता है, इसके बाद पीला और पीले के पश्चात् लाल रंग की बारी आती है।

मनुष्य भी स्वभावतः लाल रंग को खतरे का चिन्ह समझते हैं, क्योंकि लाल रंग तकलीफ देने वाला और दिमाग को परेशान करने वाला होता है। हम लाल रोशनी में पढ़ना पसन्द नहीं करते, लाल आँखी देखकर घबरा जाते हैं और यह तो सबही को मालूम है कि हरा रंग आँखों को ठंडक देने वाला होता है। हरे रंग के जानवर प्रायः शान्तिप्रिय होते हैं।

रंग परिवर्तन—

बहुत से जानवर अपने प्रसंग और अपने प्रसवकाल में नए और सुन्दर रंग उत्पन्न कर लेते हैं। पक्षियों को इसकी उच्चकोटि की विशेषता प्राप्त है। उनके रंग परिवर्तन से उनके स्वभाव में भी प्रत्यक्ष अन्तर दिखलाई पड़ता है।

यह भी देखा गया है कि सुन्दर और भड़कीले रंग के पक्षी बन्धन में आने के पश्चात् अपने रंगों की सुन्दरता और चमक खो बैठते हैं। सबसे अधिक प्रभाव लाल रंग पर पड़ता है जो क्रमशः पीला होता जाता है। यह भी देखा गया है कि यदि चिह्निया अप्राकृतिक बन्धन से मुक्त हो जाती है तो पुनः अपने

खोये हुये रंग प्राप्त कर लेतो हैं। डारविन ने लिखा है कि काले सिर की चिड़िया बहुधा क्लेव में अपना रंग नष्ट कर देती है। कारण यह है कि बन्धन का प्रभाव जानवर की प्रवृत्ति पर पड़ता है और बड़े से बड़ा और महान् अत्याचारी पशु भी अपनी आजाई को खोकर अपनी आवेशपूर्ण प्रवृत्ति और क्रोध के भयानक स्वप्न देखना छोड़ देता है और इसीलिये उसके रंगों को अधोगति होने लगती है और यही कारण है कि बन्धन का प्रभाव केवल चमकदार रंगों पर पड़ता है और साधारण रंग वैसे ही बने रहते हैं। एक बात और स्मरण रखने की है कि घरेलू जानवरों का रंग उनकी जंगली अवस्था से बिलकुल भिन्न होता है क्योंकि उनको मनुष्य के आश्रय में रहने के कारण आत्मरक्षा के रंगों की आवश्यकता ही नहीं रहती और यदि इन्हों जानवरों का सम्बन्ध मनुष्यों से विच्छेद कर दिया जाय, तो वे फिर अपने असली रंग पर आ जायेंगे।

जानवर जब बीमार पड़ते हैं तो उनके रंग की चमक-दमक में न्यूनता आ जाती है। इसका कारण यह है कि जानवर के रंग और उसके ज्ञोश-ख्रोश में चोली-दामन का साथ है। यही कारण है कि काले रंग के जानवर अन्य रंग के जानवरों की अपेक्षा बीमारी का प्रभाव कम स्वीकार करते हैं क्योंकि काला रंग जानवर के ज्ञोश और मच्चवृत्ति का एक प्रत्यक्ष चिन्ह है। इसी बात का प्रमाण हमें कभी-कभी उन जानवरों के मर जाने पर भी मिलता है जिनके रंग की चमक-दमक उनके मरने के कुछ घण्टों के पश्चात् ही प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित हो जाती है।

जानवरों का स्वभाव और आने वाली बातों को जानने की शक्ति

जानवरों के स्वभाव में प्रेम को भी एक स्थान प्राप्त है। उनमें केवल पति-पत्नी प्रेम, वात्सल्य प्रेम और अपने पालक के प्रति प्रेम ही नहीं होता बल्कि उनमें अपने साथियों से भी प्रेम होता है। वे साथी चाहे उन्हीं को जाति के हों या किसी आन्य वंश के, जैसे मैंने और नर बतख का तथा बिल्ली और डोम कौवे का। जानवरों की मित्रता के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। एक अंग्रेजी मासिक पत्र में मैंने पढ़ा था कि एक कुटुम्ब में दो जानवर पले हुए थे—एक था मैंना और दूसरा था नर बतख। दोनों प्रस्तुर अभिन्न मित्र थे। वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे। नर बतख अपने मालिक से भी खूब हिला था और उसके साथ गाँव के डाकघर तक घूमने जाया करता था। जब उसका स्वामी डाकखाने के भोतर जाता था, तब वह बाहर खड़ा उसकी बाट जोहा करता था और उसके लौट कर आने पर फिर उसके साथ चल देता था।

पशु-मित्रों का दूसरा उदाहरण एक बिल्ली और डोम कौवा का है। किन्तु 'इस दोस्ती में कभी-कभी खलल आ जाता था क्योंकि डोम कौवा अपनी शरीरती आदत के अनुसार बिल्ली की पूँछ झड़ोर कर झटक दिया करता था जब वह सोने की छुच्छुक होती थी।

इनमें शत्रुत्व का भाव भी बहुधा देखा जाता है जब ये एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं तो एक दूसरे को जान से मार डालने पर उतार हो जाते हैं। मेरे पड़ोस में बुद्धू खाला के एक भैंसे और एक बिलायती साँड़ में ऐसी शत्रुता हो गई थी कि दोनों

का एक साथ चरने छोड़ना असम्भव था। जब गायों भैंसों के गल्ले के साथ एक को छोड़ा जाता था, तो दूसरा बँधा रहता था। साथ छोड़ने पर दोनों लहू-लुहान हो जाते थे, और अन्त को भैंसे ने एक दिन बिलायती सौँड को ऐसा जखमी कर ही दिया कि वह दो-चार दिन बाढ़ मर गया।

कुछ जानवरों में दूसरों को छेड़ने की आदत, कुछ में चोरी करने का स्वभाव, कुछ में स्वामिभक्ति, कुछ में चतुरता बहुधा देखने को मिलती है। इन्हीं वृत्तियों का आभास थोड़ा-बहुत पक्षियों में भी पाया जाता है। देखने वालों को इनके प्रत्यक्ष प्रभाण वन्दरों, कुत्तों, भेड़ियों, हाथियों और कोयल आदि पक्षियों में मिल सकते हैं।

कुछ जानवर आने वाली बातों को पहले ही से जान लेते हैं इनमें में चूहे सब से चतुर होते हैं। न मालूम उन्हें आने वाली मुसीबत का ज्ञान पहले ही से कैसे हो जाता है, जिसके कारण वे आने वाले कष्ट के स्थान को छोड़ कर पहिले ही से भाग जाते हैं। नदी में बाढ़ आने का ज्ञान कुछ मछलियों को भी पहिले ही से हो जाता है।

यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि बहुत से जानवरों की श्रवण-शक्ति मनुष्य की श्रवण-शक्ति से उत्तम होती है। अतः वे बहुत सी ऐसी आवाजें सुन सकते हैं जिनका सुनना मानव-शक्ति से परे है। अतएव यह एक कारण हो सकता है जिससे जानवर ऐसी अनेक बातें मालूम कर लेते हैं जिनकी मनुष्य को कोई खबर नहीं होती। जानवरों की भावी बातें जान लेने की वृत्ति का एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें ऋतु की दशा समझने का पर्याप्त ज्ञान होता है, जिससे वे ऐसे परिणाम निकाल लेते हैं जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं। यह बहुधा

इखा गया है कि लोग कुछ पक्षियों के आगमन, साधारण गौदेयों के मिट्टी में लोटने और चींटियों के अण्डों के स्थानान्तरित होने को देखकर आने वाले श्रुतु-परिवर्तन के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करते हैं और वह प्रायः ठीक ही निकलती है। इन बातों के जीनने के लिये मनुष्य को जीव-जन्म निरीक्षक और प्रवृत्ति विशेषज्ञ होने की आवश्यकता होती है। जिन बातों को पशु-पक्षी अपनी स्वयम्भू प्रवृत्ति से जानते हैं, उनको हम भी कुछ सीमातक प्रकृति निरीक्षण से जान सकते हैं।

पक्षियों का वैज्ञानिक विश्लेषण

१—पक्षी उड़ते समय वायु को नीचे दबाते हैं। यदि वे उड़ने में पर्ख न फड़फड़ायें, तो उड़ नहीं सकते। उनके पर्खों की फड़फड़ा-हट में इतना वेग होता है कि वे कभी-कभी प्रति मिनट दो सौ बार उठते-गिरते हैं। अवरोधक शक्ति की इस क्रिया-प्रतिक्रिया से ही पक्षी क्रमशः ऊपर उठते हुये वायु में उड़ने लगते। डैनों के फड़फड़ाने में उनके बाजू की माँस-पेशियाँ अधिक महायक होती हैं, यहीं कारण है कि उड़ने वाले प्राणियों की माँस-पेशियाँ सुदृढ़ और पूर्ण विकसित होती हैं।

२—पक्षियों की अधिकांश हड्डियों का सीधा सम्बन्ध माँस की प्रणाली से होता है। अतः उनके अस्थिवातायन से बराबर हवा गुजरती रहती है।

अधिकांश पक्षियों के ऊपरी बाजू की हड्डियाँ वायु से प्रेरित होती हैं और उनकी साँस लेने की क्रिया बड़ी अद्भुत और विस्मयोत्पादक होती है।

३—पक्षियों के शरीर के कुछ अंश में डंकों से मिलते-जुलते हैं। अधिकांश भागों की रचना अत्यधिक पेचीली और विचित्र होती है। पक्षियों की रीढ़कास्थि-संगम-रेखा बहुत लम्बी होती देखी गई है। यह रीढ़कास्थि-संगम-रेखा आगे चलकर पूँछ की हड्डी से जा मिलती है। पक्षियों के पूँछ के सज्जवृत्त होने का यही कारण है। विहंगों की छाती की हड्डी में डंक की अपेक्षा बड़ी होती है। इन पखेद्धओं के वक्षस्थल पर एक ऊँची हँसुली होती है, जिसमें बड़ी-बड़ी नसें जुड़ी रहती हैं, और यही उड़ने में सहायक होती है। जो पक्षी उड़ाकू नहीं होते उनकी हँसली छोटी होती है, और कहाँ-कहाँ तो उसका सर्वथा अभाव रहता है। अफ्रोका का शुरुमुर्ग इसी कोटि के पक्षियों में होता है।

पक्षियों के सीने की हड्डी उन पाँच जोड़ी पसलियों से जुड़ी होती है जो अन्यान्य पसलियों से मिलकर मेहदरेड में चिपटी रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पसलियाँ होती हैं जिनका सम्बन्ध रीढ़कास्थि-संगम-रेखा से रहता है। सीने की हड्डी से उनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं देखा जाता। कंधे की हड्डियाँ लम्बी और संकीर्ण होती हैं। उनके पेह्ज की हड्डियों की बनावट भी बड़ी जटिल होती है।

४—पक्षियों के पंजों की रचना में कुछ उँगलियाँ आगे कुछ पीछे और कुछ अगल-बगल के ईर्द-गिर्द चकाकार होती हैं। पंजों की पीछे की हड्डियों की रचना भी बड़ी जटिल होती है।

५—जलचर पक्षियों में बतख, पन्डुच्ची, थलचरों में शुरुमुर्ग मुख्य हैं। तीसरे प्रकार के पक्षी साधारण नभचर कहे जाते हैं।

ज्ञान पर चलने वाले पक्षी अँगूठे तक परों से ढके रहते हैं, बृक्ष पर चढ़ने वालों की अँगुलियाँ लम्बी होती हैं—दो आगे

पक्षियों का वैज्ञानिक विवरण]

और दो पीछे की ओर। पाश्चात्य देशों की कोयल और भारत का कठफोड़वा इसी श्रेणी की चिड़ियाँ हैं। अतः भिज-भिज पक्षियों के आकार-प्रकार, रहन-सहन, चाल-ढाल और बनावट में अमीन-आसमान का अन्तर होता है।

६—पक्षियों के सिर की खोपड़ी सच्चबूत होती है और घनी-अस्थि-जालियों पर अवलम्बित रहती है। सिर और गर्दन अँगूठी के आकार की हड्डियों पर मिलते हैं। चेहरे की हड्डियाँ ही आगे बढ़कर चोंच बन जाती हैं। इनके किनारे आरे की तरह तेज होते हैं। किसी की चोंच वक्र और तुकीली, और किसी की सीधी और भोंथरी होती है, क्योंकि जिसे जैसी आवश्यकता हुई उसे वैसी ही चोंच प्रकृति ने दी। बतख और तोते की चंचु-विभिन्नता का यही कारण है।

७—पक्षियों की पाचन-प्रणाली में डक अथवा पशुओं की पाचन प्रणाली से भिन्न होती है। प्रत्येक प्राणी की पाचन-क्रिया में लार का बहुत बड़ा अंग विद्यमान रहता है। इसी के योगदान से जठरातल भोजन को हज्जम करता है। किन्तु पक्षियों की पाचन-शक्ति का इस लार से कोई सम्बन्ध नहीं होता। उनके मुँह से लगातार उदर तक एक लम्बी नली होती है जिसका प्रारम्भिक अंश संकीर्ण रहता है; परं जैसे-जैसे वह नली आगे बढ़ती है, फैलती जाती है और अन्त में जाकर वह एक पोट का रूप पकड़ लेती है। उनका क्रिया हुआ भोजन उसी नली के द्वारा पोट के गुहागहर में जा पड़ता है, जिसमें कठोर से कठोर वस्तुओं को भी मोस सा मुलायम बना देने का एक नैसर्गिक यंत्र है। जब खाद्यपदार्थ में काफी मृदुलता आ जाती है तब वह एक संकीर्ण और छोटी शैली में उतरता है, जहाँ पाचन-रस तैयार होकर भोजन में मिलता जाता है। इस छोटी शैली को पार करके रस-युक्त भोजन द्वितीय उदराशय में प्रवेश करता है। वहाँ यांत्रिक क्रिया-प्रति-

क्रियाओं के द्वारा वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम परमाणुओं में परिणत होता है। द्वितीय उदर की माँस-पेशियाँ अत्यन्त शक्तिशालिनी होती हैं, और बज्र-तुल्य कंकड़-पत्थरों को भी बात की बात में पीस डालती है। संसार के अन्यान्य प्राणियों के दाँत और उदर जो कार्य करते हैं, वही कार्य पक्षियों की संकीर्ण थैली और द्वितीय उदर के द्वारा सम्पन्न होता है। संकीर्ण थैली का कार्य रसायननिक है और द्वितीय उदर का यांत्रिक। इस प्रकार नवनिर्मित पदार्थ एक टेढ़ी-मेढ़ी नली से आँत में प्रवेश करता है। जहाँ वह अधिक नीरस हो जाता है।

८—पखेहओं की नरेटी की रचना भी बड़ी विचित्र होती है। वे सौंस की क्रिया फेफड़ों से करते हैं जिसका सम्बन्ध शरीर के आन्तरिक वायुकोष से रहता है। इसके अतिरिक्त उनकी अस्थि-कमाचियों का भिरभिरापन भी वायु की गतिशीलता में सहायक होता है।

पक्षियों का तंतु-संस्थापन पशुओं-सा रहता है। एक से विशुद्ध शोणित संचालित होता है और दूसरे से दूषित। अन्यान्य प्राणियों की अपेक्षा पक्षियों के रक्त में अधिक उष्णता है, अबाबील का रक्त-ताप ११२ अंश फारेंहाइट रहता है।

९—क्रद की दृष्टि से इनकी आँखें बड़ी हैं और उनकी रक्त गतिशील पपोटों से होती है। पपोटों के ऊपर पारदर्शी भिलियों का पर्दा रहता है। आँख की पुतलियों की बनावट भी ऐसी होती है कि वे दूर तक देख सकें।

१०—पक्षियों की श्रवण-शक्ति शब्दों को शीघ्र प्रहण कर लेती है, यद्यपि उनके कान उनकी आँखों के कुछ नीचे और पीछे की ओर पंखों में बन्द रहते हैं। उनकी स्पर्श, स्वाद और ग्राण-

पक्षियों का वैज्ञानिक विश्लेषण]

शक्ति विकसित नहीं होती; और भिन्न-भिन्न पक्षियों में ये शक्तियाँ समाधिक मात्रा में पाई जाती हैं।

११—ऋतु परिवर्तन के अनुसार पक्षियों के शरीर का रंग भी परिवर्तित होता रहता है। वर्ष में प्रत्येक पक्षी कम से कम एक बार और कोई-कोई एकाधिक बार अपना पुरातन परिधान बदल कर रंगीन नये चोले में निखर उठते हैं। अवासील वर्ष में एक बार और 'टारमिजन' तीन बार नये पंखों का परिधान पहनते हैं। शरद ऋतु के आरम्भ में प्रायः सभी पक्षी अपना कायापलट कर देते हैं, और कुछ बसन्त ऋतु में भी यह किया करते हैं।

शरदऋतु में उत्तर देशों के रहने वाले पक्षी, सर्दी की अधिकता से उत्पन्न होने वाले खाद्य-पदार्थों के अभाव के कारण भोजन की खोज में दक्षिण की ओर लौटते हैं और हिमालय के अंचल को लौँघ कर बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुये हिन्दुस्तान में पहुँचते हैं। इस यात्रा में वे घन्टे में बीस से लेकर साठ कोस तक उड़ते हैं। इनकी यात्रायें प्रायः रात में हुआ करती हैं। वे तिक्कत की ओर से या तो पहाड़ की घाटियों से आते हैं या ब्रह्मपुत्र के रास्ते से। इन नवागन्तुक अतिथियों में 'थिरथिरा' और 'तेलिया मैता' हमारे चिरपरिचित हैं। और बहुत से पक्षी जैसे धोविन, पीलक आदि, जो भारत की गर्मी को बर्दाशत नहीं कर सकते, इन दिनों उत्तर की दिशा में प्रयाण कर देते हैं और पहाड़ी प्रदेशों में ही गर्मी का मौसम बिताते हैं।

साँप और उसके शत्रु

साँप का नाम ही ढरावना मालूम देता है। साँप चाहे विषेला हो और चाहे विषहीन, किन्तु उसके देखने ही से भय उत्पन्न होता है। दुमुही यद्यपि तनिक भी हानिकर नहीं होती फिर भी लोग उससे डरते हैं। अतः यह बात स्मरण रखने की है कि प्रत्येक साँप ज्हहरीला नहीं होता और ज्हहरीला साँप भी उसी समय अपने ज्हहर का प्रयोग करता है जब उसे अपनी जान का भय होता है।

केवल मनुष्य ही साँपों का शत्रु नहीं होता बल्कि बहुत से भिन्न-भिन्न प्रकार के जानवर साँप को मारने और खाने के लिये तैयार रहते हैं, और उनमें से कुछ का भोजन ही साँप होते हैं। साँप के सबसे बड़े शत्रु स्वयं साँप ही होते हैं। दूसरे साँपों को नहीं खाते। केवल कुछ खास साँप ऐसे होते हैं जो दूसरे साँपों को खाते हैं। इनमें कोबरा सबसे बड़ा और सब से अधिक भयंकर होता है। कोई-झोई कोबरा चार गज से भी अधिक लम्बा होता है और उसका मुख्य भोजन साँप ही होते हैं। साँपों का दूसरा शत्रु कीड़ियाला है, जिसके काटने से हिन्दु-स्तान में सबसे अधिक मृत्युएँ होती हैं। इसका भोजन चूहे और अन्य प्रकार के साँप होते हैं। यह घरों में घुसने का बड़ा प्रेमी होता है। नदी और ताल के पानी में रहने वाले साँप प्रायः ज्हहरीले नहीं होते किन्तु समुद्र में रहने वाले साँप बड़े ज्हहरीले होते हैं।

साँप को मारने वाले अन्य जानवरों में नेवला मुख्य है। वह साँप से लड़ता है और बड़ी होशियारी से उसकी चोटें बचाता है। और अन्त में उसका सिर पकड़ कर उसे परास्त करके खाता है।

सॉप और उसके शब्द]

सॉप के अन्य शब्दों में ‘साही’, ‘ग्लास स्नेक’ तथा ‘आर मिडल’ नामक जानवर हैं। ग्लास स्नेक कोई सॉप नहीं होता, बल्कि छिपकली वंश का सॉप के समान, एक कीड़ा होता है। यह ‘वाइपर’ सरीखे विषैले सॉप को भी निर्भय होकर खा जाता है। आरमिडिल दक्षिण अमेरिका का साही के समान, एक कबचधारी जानवर है। छिपकली जाति के कई अन्य जानवर भी सॉप को खा जाते हैं जैसे “आँख छिपकली”। दक्षिण अमेरिका का “तेजो” भी सॉप खाता है। यह सुर्यों के अण्डों और बच्चों को भी खा जाता है।

कुछ चिड़ियाँ भी सॉप को खाती हैं। इनमें दक्षिण अफ्रीका की “सेक्रेटरी चिड़िया” एक है। यह सॉप को अपने पैरों से कुचल कर उसकी हड्डियाँ अलग-अलग कर देती हैं और फिर उसे पूँछ की ओर से खाना आरम्भ करती देती है तथा अन्त में उसके सिर के टुकड़े-टुकड़े करके खा जाती है। गरुड़ या डक्काब भी सॉप को खा लेता है। हमारे यहाँ के मोर और अमेरिका की चीलहें भी सॉप को खाते हैं। घड़ियाल और नाके भी सॉप को मारने में प्रतिष्ठा है।

जिस प्रकार पानी के रहने वाले सॉप विषैले नहीं होते वैसे ही घास में रहने वाले सॉप भी जहरीले नहीं होते। सॉपों के पकड़ने में कोई जादू नहीं होता, केवल दाथ की सफाई होती है। सॉप सदा हिलती हुई वस्तु पर आक्रमण करता है। अगर कोई उसके सामने चुपचाप खड़ा रहे तो वह कदापि हमला न करेगा। सँपेरे लोग उसे होशियारी से पकड़ कर उसके जहरीले दाँद उखाड़ डालते हैं और फिर उसका तमाशा दिखाते हैं।

जानवरों का गर्भकाल

काँगारू यद्यपि बहुत बड़ा जानवर है किन्तु उसका बच्चा जन्म के समय एक छोटे चूहे से बड़ा नहीं होता। पैदा होने के कुछ दिन बाद भी वह इस योग्य नहीं होता कि अपनी माँ से अलग रह सके। उसकी माँ के पेट में एक थैली होती है जिसमें वह एक असें तक सुरक्षित रूप से पलता रहता है।

चूहे का बच्चा २१ दिन पेट में रहता है।

खरगोश का बच्चा २० दिन पेट में रहता है।

भेड़ और बकरी के बच्चे का गर्भकाल २१ सप्ताह, गाय के बच्चे का ९ मास, सुअर का १६ सप्ताह, घोड़े का ११ मास, हाथी का २० मास, ऊँट का ४९ सप्ताह, हँसे का १० मास, बिल्ली का ५६ दिन, शेर का १५ सप्ताह, चीते का २२ सप्ताह, रीछ का ७ मास, दरयाई घोड़े का १ साल, बन्दर का ७ मास, और आदमी का २८० दिन होता है।

जिन जानवरों के बच्चे जितने अधिक काल तक माँ के पेट में पलते हैं उतनी ही अच्छी दशा में वे पैदा होते हैं, जैसे हाथी और चूहे के बच्चे गर्भकाल में अधिक दिन रहने वाले बच्चे, अधिक समय तक माँ पर आश्रित नहीं रहते। वे बिना माँ के भी जीवित रह सकते हैं।

जानवरों की पूँछें और उनका प्रयोग]

जानवरों की पूँछें और उनका प्रयोग

विभिन्न प्रकार के पशुओं की पूँछ सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन अत्यन्त रोचक होगा। इससे यह भी मालूम हो सकता है कि पशुओं की पूँछें भिन्न-भिन्न प्रकार की क्यों होती हैं।

पशुओं की पूँछें भिन्न होने का कारण यह कि प्रत्येक पशु अपनी पूँछ का प्रयोग भिन्न प्रकार से करता है। गायें अपनी पूँछ को धीठ पर इधर-उधर हिलाया करती हैं। इसके द्वारा वे मक्खियों को उड़ा देती हैं। मक्खियों को उड़ाने के लिए गायों पास पूँछ ही एक अस्त्र है जो कि उनके सारे शरीर में पहुँच सकता है।

बन्दर अपनी पूँछ का प्रयोग अन्य प्रकार से करता है। वे लोग प्रायः अपनी पूँछ को वृक्ष की शाखा में लपेट लेते हैं और अपने शरीर को स्वतन्त्रतापूर्वक लटका देते हैं।

कँगारू अपनी पूँछ का प्रयोग बड़ी विचित्र तरह से करता है। उसकी पूँछ बड़ी लम्बी और मजबूत होती है। वह बैठने के समय इसका उपयोग तिपाई के एक पैर की भाँति करता है, इससे बैठने के समय उसको बहुत आराम मिलता है।

गिलहरियों के पूँछ का उपयोग भी विचित्र है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर ढौँढ़ने में गिलहरी की बड़ी सहायता करती है क्योंकि पूँछ के कारण उसके शरीर का बज्जन प्रत्येक अवस्था में समान रहता है।

प्राणी-राज्य के प्रेत-कर्म करने वाले

एक समय आता है जब लम्बे से लम्बा जीवन व्यतीत करने वाला जानवर अपने साधनों को व्यय कर डालता है।

(४) दक्षिणी-ध्रुव प्रदेश में पेंगिन पक्षियों में यदि कोई अनाथ बचा हो, तो दूसरे पेंगिन उसे पालने के लिये आपस में भगाड़ पड़ते हैं और अनाथ अण्डे कई बार दो-चार पक्षियों की समता भरी लड़ाई में फूट जाते हैं ।

(५) आट्रेलिया की भाई में रहनेवाले मुर्गों में अपने घर की की सफाई का ख्याल अत्यधिक देखने में आया है । कभी-कभी ये 'बुशटर्की' ५० टन कुड़ा अकेले साफ़ कर देते हैं । कहीं इन मुर्गों ने इकट्ठे घर बनाया, तो आदमी के बराबर ऊँची और ५० गज़ लम्बी एक गुफा सी वे बना लेते हैं, जिसमें गिरगिट भी अपने अण्डे रख देता है । और सूरज की धूप में जब इस मुर्गी के और गिरगिट के अण्डे एक साथ सिंकते हैं, तो चैकि गिरगिट कई बार जल्दी जीवन ग्रहण कर लेते हैं अतएव इस मुर्गी के अण्डों से उन्हें परसा हुआ आहार मिल जाता है ।

(६) सुवर्ण-गँरुण में एक खूबी देखने में आई है कि वह किसी पहाड़ की ऊँची चोटी पर बने घोंसले के पास ही खाने की वस्तु गिरा देता है, जिससे बच्चे उस खाद्य के लालच में स्वावलम्बी होकर अपने घोंसले से उड़ने की कोशिश करते हैं ।

(७) बाघ बगैरह पशुओं की भी आदत होती है कि वे अधमरा-सा एक शिकार जंगल से घसीट कर अपनी गुफा तक ले आयेंगे, जिससे उनके पुत्र-पुत्री स्वच्छन्द शिकार का अभ्यास कर सकें । बिल्ली को अपने बच्चों के लिये चूहा लाते तो हम सब ने देखा होगा ।

(८) भेड़िये और हिरन आदि हमेशा जल्दी बनाकर रहते हैं और उन्हें अपने नेता पर पूर्ण विश्वास रहता है ।

(९) कोडियाक द्वीप के भालू के प्रति बार जुड़वा बच्चे होते हैं और कोई भी बच्चा चूहे से बड़ा नहीं होता ।

शब्द कोष]

शब्द-कोष

Amoeba—एक-कोषीय या एक 'सेल' वाला कीटाणु ।

Anemone—समुद्री वायु-पुष्प, समुद्री फूल ।

Ant-eater—चौंटी-भक्षी ।

Akimbo—जिस प्रकार कमर पर हाथ रखने से कोहनियाँ बाहर की ओर हो जाती हैं ।

Acid secretion—अम्ल-रस, तेजाव ।

Archer—तीरन्दाज ।

Angler—लुभाने वाली मछली ।

Anaconda—एक प्रकार का साँप ।

Aphid—पौधा-जूँ ।

Amphibian—उभचर, स्थल-जलचर ।

Abnormal—समाधिक ।

Birturong—हिमालय की रीछ बिल्ली ।

Bacilli—कृमि ।

Blenny—खारदार पर वाली मछली ।

Bluff—छल ।

Boa-conistractor—सिकुड़ने वाला साँप ।

Bootlace—जूते के फोते की तरह का कृमि ।

Boa—ब्रजगर ।

Beetle—गुवरीला ।

Cones—कोकला ।

Counerpart—जोड़े की वस्तु ।

Chrysalis—दिरोधी कोषस्थ अवस्थाएँ ।

Crazy quilt—अल-जलूल रचाई ।

Crab—क्रेकड़ा ।

Cricket—झोंगुर ।

Crawfish—केकड़े की आकृति की मछली ।

Crustacean—छिलके या खोलदार मछलियाँ ।

Cerebrum—मस्तिष्क का अग्र भाग ।

Cerebellum—मस्तिष्क का पृष्ठ भाग ।

Caterpillar—निनगा, तितली का पहल रूप ।

Cochineal—कृमिदाना ।

Cuttlefish—दो-शाखा मछली ।

Catfish—बिल्ली मछली ।

Clam—घोंघा ।

Culture—कृत्रिम उत्पत्ति ।

Corp—मीठे पानी की मछली ।

Cell—कोषाणु, कोष, रंध्र ।

Carbon—अंगारका वायु ।

Diaphram—सहा-प्राचीर-परदा ।

Drum—क्षणोदय ।

Dinasaur—एक वृहत्ताकार देंगने वाला जानवर ।

Dormouse—गिलहरी के समान एक छोटा जानवर ।

Eagle—गरुड़ ।

Eel—जल-व्याल ।

Egret—बगुला ।

Earthworm—केंचुआ ।

Fangs—पोले नोकदार और जहरीले ढाँत ।

Flea—पिस्तू ।

Focus—केन्द्र-विन्दु ।

Food—भक्षण ।

Fins—पंख, सुकने ।

Ferret—विल्ली ।

Firefly—जुगनू ।

Feelers—त्पर्शक ।

Ferrets—नेवले की जात बाले जीव ।

Fungus—छुक्कमुक्ता ।

Gynander—प्रकृति के अजूबे जिनमें योनि की पिण्डीकारी होती है ।

Germ—कीट ।

Grub—कोआ, घुन ।

Goose—बतख ।

Gulls—मुरांबी ।

Gecko—घरेलू छिपकली ।

Glow-worm—जुगनू ।

Grey mullet—कोसल मछली ।

Gander—नर बतख ।

Humming—गुनगुनाहट या भन-भनाहट पैदा करने वाली ।

Hippopotamus—दरियाई गैंडा ।

Hedgehog—जंगली चूहा ।

Hawk—बाज़ ।

Hermaphrodite—वह प्राणी जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण हों, द्विजिंग, उभयजिंग ।

Herbivorous—शाकाहारी ।

Hydrogen—उद्भव ।

Inguana—छिपकलियाँ ।

Insectivorous—कीटाहारी ।

Jellyfish—झींगा मछली ।

Jackass—तूती परिवार का एक पक्षी ।

Jackdaw—डोम कौआ ।

Kingfisher—रामचिरैया जाति का एक पक्षी, किलकिला

Lens—ताले ।

Lobster—झींगा मछली ।

Lime stone—मुलायम पत्थर ।

Lumpfish—भद्दो खारदार मछली ।

Lemur—एक प्रकार का वन्द्र ।

Larva—कीट-डिस्च ।

Mambas—अफ्रीका का जहरी साँप ।

Mosaic—पिचोकारी, ज्ञानक्षमी ।

Mite—घुन ।

Mollusc—घोंधा या सिपी ।

Marmot—मैदानी गिलहरी ।

Mussel—घोंधा ।

Matter—द्रव्य, तत्त्व, जड़ वस्तु ।

Maggots—कीड़े ।

Marmoset—एक प्रकार का बन्दर ।

Mammals—स्तनपायी ।

Newt—गोह ।

Naturalist—प्रकृति-श्रेमी ।

Numb-fish—सुन्न मछली ।

Nerves—संज्ञावाहिनी, स्नायु ।

Oxygen—प्राणवायु, ओ॒षजन ।

Osiphone—सुनने को मशीन ।

Octopus—अष्टपद ।

Oyster—कस्तूरा मछली ।

Puff—अफ्फीका का चहरी साँप ।

Permanganate of Potash—लाल दवा ।

Perch—चड़ने वाली मछली ।

Plover-like—बुलबुल की तरह की ।

Parasite—परोपकीयी, परजीवी ।

Plastic surgery—आकार देने वाली जर्ही ही ।

Pipe-fish—तलो वाली मछली ।

Placenta—ताभिनाल, कसल ।

Prawn—भींगा ।

Potentially—दृष्टव्य रूप से ।

Puberty—यौवनकाल ।

Palol—एक छाँसि ।

Python—एक प्रकार का साँप ।

Pupa—इल्ली, मूक कीटावस्था ।

Quiver—कँपकँपी ।

Rotifer—पहिचा-प्राणी ।

Rat-tailed maggot—मूषक-पुच्छ कीट ।

Reptiles—सरीसृप ।

Raven—डोम कौआ ।

Rodent—दंशक ।

Sting-rays—एक प्रकार की मछली जिसका काँटा जाहरीला होता है ।

Snail—घोंधा ।

Stereoscopic—दूरबीन का-सा ।

Shrimp—समुद्री केकड़ा ।

Starfish—सिताग मछली ।

Stickleback—वह छोटी-सी मछली जिसकी पीठ की हड्डी काँटेदार और बड़ी तेज़ होती है ।

Squid—वह मछली जो चारे के बजाय इरतेसाल की जाती है ।

शब्द कोष]

Shell—सिप्पी ।

Spring—बसन्त ऋतु ।

Sea-urchin—समुद्री-साही ।

Siphonepipe—टेढ़ी नली ।

Swallow—अबाबील ।

Sentiment—भावना ।

Sea-cucumber—समुद्री ककड़ी ।

Scallop—सदकी मछली ।

Slipper Limpet—एक छोटा-सा घोंघा ।

Spermwhale—तैलीय हेल मछली ।

Spur—झुआ हुआ काँटा ।

Sulphur whale—गन्धक हेल मछली ।

Spindles—टेकुण ।

Toad—मेंढक ।

Trigger-fish—एक प्रकार की मछली जिसके काँटे में
जहर होता है ।

Tub—कठौता ।

Tuatera—एक प्रकार की छिपकली ।

Tusks—हाथी के नुकीले बाहरी दाँत ।

Ticks—किलनियाँ ।

Turtle—समुद्री कछुआ ।

Tapeworm—फीते की शक्ति का कृमि ।

Terriers—शिकारी कुत्ते ।

~~Vertical~~—खड़े बल ।

~~Vibration~~—स्पन्दन ।

Vertebrate—मेरुदण्डी ।

Wart—अधिमाँस, मस्सा ।

Whelk—सदकी घोंघा ।

Winkle—झोंगा ।

Weever—नश्तरी मछली ।

Walrus—दृश्याई घोड़ा ।

Worms—कूमि ।



